

FYLGISEÐILL

1. Heiti dýralyfs

Spectrabactin Vet 40 mg/10 mg töflur handa köttum og hundum

2. Innihaldslýsing

1 tafla inniheldur:

Virk innihaldsefni:

Amoxicillín (sem amoxicillínþríhýdrat)	40 mg
Klavúlansýra (sem kalíumklavúlanat)	10 mg

Hjálparefni:

Erytrósín (E127)	0,75 mg
------------------	---------

Bleikar, ílangar töflur með deilstriki.

Töflunni má skipta í helminga.

3. Markdýrategundir

Kettir og hundar.

4. Ábendingar fyrir notkun

Til meðferðar á sýkingum af völdum sýkla sem eru næmir fyrir amoxicillíni í samsetningu með klavúlansýru (þar sem klínísk reynsla og/eða næmisprófun hafa gefið til kynna að samsetningin sé kjörlyfið).

Notkun nær yfir:

Húðsýkingar (þar með taldar yfirborðs- og djúpar pyoderma-sýkingar) af völdum *Staphylococcus* spp. og *Streptococcus* spp.;

Sýkingar í munnholi (slímhúð) af völdum *Clostridium* spp., *Trueperella* spp. (áður *Corynebacterium* spp.), *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp. *bacteroides* spp. og *Pasteurella* spp.;

Sýkingar í þvagrás af völdum *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Escherichia coli* og *Proteus mirabilis*;

Sýkingar í öndunarvegi af völdum *Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., og *Pasteurella* spp.;

Sýkingar í maga og þörmum af völdum *Escherichia coli* og *Proteus mirabilis*.

5. Frábendingar

Gefið ekki kanínum, naggrísum, hömstrum eða stökkmúsum.

Gefið ekki dýrum sem hafa ofnæmi fyrir virku efnunum, eftir ór β-laktam-hópnum eða einhverju hjálparefnanna.

Gefið ekki dýrum með lítil þvaglát (oligurea) eða þvagþurrð (anuria) af völdum skertrar nýrnastarfsemi.

Notið ekki ef vitað er um ónæmi gagnvart samsetningu amoxicillíns og klavúlansýru.

6. Sérstök varnaðarorð

Sérstakar varúðarreglur til öruggar notkunar hjá markdýrategendum:

Leggja þarf vandlega mat á skammtaáætlun handa dýrum með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi. Notkun lyfsins skal byggjast á næmisprófunum og tillit skal tekið til lands- og svæðisbundinna opinberra reglna um notkun breiðvirkra sýklalyfja. Notið ekki á sýkla sem eru næmir fyrir þróngvirkum penicillínlyfum eða amoxicillíni einu sér. Ef lyfið er notað á annan hátt en leiðbeiningarnar í samantekt á eiginleikum lyfsins (SPC) segja til um er hætta á aukinni útbreiðslu sýkla sem er ónæmir á amoxicillín og klavúlansýru, auk þess sem það getur dregið úr verkun meðferðar með öðrum β-laktam-sýklalyfum vegna möguleika á krossónæmi.

Sérstakar varúðarreglur fyrir þann sem gefur dýrinu lyfið:

Penicillín- og cefalósporínlyf geta valdið ofnæmi við inndælingu, innöndun, inntöku eða snertingu við húð. Penicillínofnæmi getur leitt til krosssvörunar við cefalósporínlyf og öfugt. Ofnæmisviðbrögð við þessum efnunum geta stundum verið alvarleg.

- Meðhöndlaðu ekki þetta lyf ef þú veist að þú ert næm(ur) fyrir því, eða ef þér hefur verið ráðlagt að vinna ekki með slík efini.
- Meðhöndlaðu lyfið af varuð til þess að koma í veg fyrir útsetningu og gerðu allar ráðlagðar varúðarráðstafanir.
- Ef þú færð einkenni, s.s. útbrot, eftir að hafa meðhöndlað lyfið, skaltu leita til læknis og hafa meðferðis fylgiseðil eða umbúðir dýralyfsins. Bólgur eða proti í andliti, á vörum eða augum eða öndunarerfiðleikar eru alvarlegri einkenni og þarfnað tafarlausrar læknishjálpar.
- Þvoið hendur eftir notkun.
- Til að forðast inntöku fyrir slysni skal geyma töflur þar sem dýr ná ekki til.

Sérstakar varúðarreglur til þess að vernda umhverfið:

Á ekki við.

Aðrar varúðarreglur:

Gæta skal varúðar við notkun lyfsins hjá litlum grasætum öðrum en þeim sem taldar eru upp í kaflanum „Frábendingar“.

Meðganga og mjólkurgjöf:

Rannsóknir á rottum og mósum hafa ekki sýnt fram á fósturskemmdir eða eiturverkanir á fóstur. Engar rannsóknir hafa verið gerðar á þunguðum eða mjólkandi titum eða læðum. Dýralyfið má eingöngu nota að undangengnu ávinnings-/áhættumati dýralæknis.

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir:

Bakteríuhemjandi sýklalyf (t.d. klóramfenikól, makrólíðar, súlfonamíð og lyf af tetracyklínflokki) geta hamlað sýkladrepandi áhrifum penicillínlyfja.

Hafa skal í huga möguleikann á krosssvörum ofnæmis við önnur penicillínlyf.

Penicillínlyf geta aukið áhrif amínoglykósíða.

Ofskömmun:

Væg einkenni frá maga og þörmum (niðurgangur og uppköst) geta gert oftar vart við sig eftir ofskammt á lyfinu.

7. Aukaverkanir

Hundar:

Koma örsjaldan fyrir (<1 dýr / 10.000 dýrum sem fá meðferð, þ.m.t. einstök tilvik):	Uppköst ^a , niðurgangur ^a
--	---

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)	Blóðmein (afbrigðileiki í blóði), ristilbólga Bráðaofnæmi (veruleg ofnæmisviðbrögð), húðviðbrögð
--	---

^a Væg. Í slíkum tilvikum skal hætta lyfjagjöf og veita meðferð við einkennum.

Kettir:

Koma örsjaldan fyrir (<1 dýr / 10.000 dýrum sem fá meðferð, þ.m.t. einstök tilvik):	Uppköst ^a
Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)	Blóðmein (afbrigðileiki í blóði), ristilbólga, niðurgangur ^a Húðviðbrögð, bráðaofnæmi (veruleg ofnæmisviðbrögð)

^a Væg. Í slíkum tilvikum skal hætta lyfjagjöf og veita meðferð við einkennum.

Mikilvægt er að tilkynna aukaverkanir. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með öryggi dýralyfsins. Byrja skal á að gera dýralækni viðvart ef vart verður einhverra aukaverkana, jafnvel aukaverkana sem eru ekki tilgreindar í fylgiseðlinum, eða ef svo virðist sem lyfið hafi ekki tilætluð áhrif. Það er líka hægt að tilkynna aukaverkanir til markaðsleyfishafans eða fulltrúa markaðsleyfishafans með því að nota upplýsingar um tengiliði sem eru aftast í fylgiseðlinum eða gegnum tilkynningakerfi lyfjayfirvalda www.lyfjastofnun.is.

8. Skammtar fyrir hverja dýrategund, íkomuleiðir og aðferð við lyfjagjöf

Fylgið leiðbeiningum dýralæknisins um skammta.

Lyf einungis til inntöku. Skammtahlutfallið er 10 mg amoxicillín/2,5 mg klavúlansýra /kg líkamsþyngdar tvisvar á dag.

Ákvarða skal líkamsþyngd eins nákvæmlega og hægt er til að tryggja réttan skammt og koma í veg fyrir undirskömmtu.

Eftirfarandi tafla er ætluð til leiðbeiningar við skömmtu á lyfinu í staðalhlutfallinu 10 mg amoxicillín/2,5 mg klavúlansýra /kg tvisvar á dag.

Líkamsþyngd (kg)	Fjöldi taflna tvisvar á dag
1 til \leq 2	$\frac{1}{2}$
> 2 til \leq 4	1
> 4 til \leq 6	$1\frac{1}{2}$
> 6 til \leq 8	2

Í þrálátum tilfellum má tvöfalta skammtinn upp í 20 mg amoxicillín/5 mg klavúlansýra /kg líkamsþyngdar tvisvar á dag.

Meðferðarlengd:

Hefðbundin tilvik, allar ábendingar:

Svörum fæst í flestum tilvikum eftir 5 til 7 daga meðferð. Ef enginn árangur er af 5-7 daga meðferð er nauðsynlegt að endurtaka læknisskoðun.

Langvinn eða þrálát tilfelli:

Í langvinnum tilfellum getur þurft að beita sýklalyfjameðferð í lengri tíma. Þegar þannig stendur á er það í höndum læknisins að ákvarða lengd meðferðarinnar, en hún verður að vera nógu löng til þess að tryggt sé að sýkingin sé horfin.

9. Leiðbeiningar um rétta lyfjagjöf

Töflunum má blanda í smáskammt af fæðu.

10. Biðtími fyrir afurðanýtingu

Á ekki við.

11. Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Geymið töfluhelminga í þynnupakkningunni.

Geymið þynnupakkninguna í ytri umbúðum.

Geymsluþol eftir að innri umbúðir hafa verið rofnar: 12 klst.

Farga skal töfluhelmingum eftir 12 klst.

Ekki skal nota dýralyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á þynnupakkningu og öskju á eftir Exp. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

12. Sérstakar varúðarreglur vegna förgunar

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi.

Ónotuðum dýralyfjum og úrgangi sem fellur til við notkun þeirra skal farga í gegnum lyfjaskilakerfi samkvæmt reglum á hverjum stað og því kerfi sem við á í hverju landi. Markmiðið er að vernda umhverfið.

Leitið ráða hjá dýralækni eða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota.

13. Flokkun dýralyfsins

Dýralyfið er ávísunarskylt.

14. Markaðsleyfisnúmer og pakkningastærðir

IS/2/20/005/01

Þynnupakkningar gerðar úr pólýamíð/ál/pólývínyllklóríðþynnu, hitainnsiglaðar með álfilmu (25 µm) í 6-töflu strimli. Öskjur innihalda 12, 24 eða 120 töflur.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

15. Dagsetning síðustu endurskoðunar fylgiseðilsins

Febrúar 2025. Ítarlegar upplýsingar um dýralyfið eru birtar í [gagnagrunni Evrópusambandsins yfir dýralyf](#) (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Tengiliðaupplýsingar

Markaðsleyfishafi:

Dechra Regulatory B.V.

Handelsweg 25

5531 AE Bladel

Holland

Framleiðandi sem er ábyrgur fyrir lokasamþykkt:

Laboratorio Reig Jofré SA
Jarama s/n Polígono Industrial
45007 Toledo
Spánn

Genera Inc.,
Svetonedeljska cesta 2,
Kalinovica,
10436 Rakov Potok,
Króatía

Fulltrúar markaðsleyfishafa og tengiliðaupplýsingar til þess að tilkynna grun um aukaverkanir:

Dýraheilsa ehf.
Sími: 544 2240/820 2240

17. Aðrar upplýsingar