

## Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

**Elvanse Adult 30 mg hörð hylki**

**Elvanse Adult 50 mg hörð hylki**

**Elvanse Adult 70 mg hörð hylki**

lisdexamfetamíntvímesýlat

### Mikilvæg atriði sem þú þarft að vita um lyfið

**Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.**

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4 til að fá frekari upplýsingar.

### Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar

1. Upplýsingar um Elvanse Adult og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Elvanse Adult
3. Hvernig nota á Elvanse Adult
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Elvanse Adult
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

#### 1. Upplýsingar um Elvanse Adult og við hverju það er notað

##### Hvað Elvanse Adult er

Elvanse Adult inniheldur virka efnið lisdexamfetamíntvímesýlat sem hjálpar til við heilastarfsemina. Lyfið getur hjálpað til við að bæta athygli þína og einbeitingu og jafnframt dregið úr hvatvísi. Elvanse Adult er langverkandi lyf sem virkar smám saman á 14 klukkustunda tímabili.

##### Við hverju það er notað

Elvanse Adult er meðferð við „athyglisbresti með ofvirkni“ (ADHD) hjá fullorðnum.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki eftir eins mánaðar meðferð.

Fyrir börn og unglunga á aldrinum 6 til 17 ára er fánlegt annað lyf sem inniheldur lisdexamfetamíntvímesýlat. Elvanse Adult er ekki notað til að meðhöndla ADHD hjá börnum yngri en 6 ára því ekki er vitað hvort það sé öruggt eða hjálpi svona ungu fólki.

##### Hvernig það virkar

Elvanse Adult eykur virkni í ákveðnum hlutum heilans sem eru ekki nægilega virkir. Lyfið getur hjálpað til við að bæta athygli og einbeitingu og jafnframt dregið úr hvatvísi.

Lyfið er gefið sem hluti af meðferðaráætlun sem venjulega samanstendur af eftirfarandi:

- sálfræðimeðferð
- fræðslumeðferð
- atferlismeðferð
- iðjuþjálfun
- félagslegri meðferð

Því er eingöngu ávísað af læknum sem hafa reynslu í að meðhöndla einstaklinga með hegðunarvandamál.

Ef þú hefur ekki fengið meðferð við ADHD áður, mun læknirinn athuga hvort þú hafir verið með ADHD frá barnæsku áður en hann ávísar Elvanse.

### Um ADHD

Fólki með ADHD finnst erfitt að:

- sitja kyrrt
- einbeita sér

Það er ekki þeim að kenna að þau geta ekki gert þetta. Hins vegar getur ADHD valdið erfiðleikum í daglegu lífi. Fólk með ADHD getur átt í erfiðleikum með að vinna, læra, með sambönd og haft lágt sjálfsálit.

ADHD hefur ekki áhrif á greind einstaklings.

## 2. Áður en byrjað er að nota Elvanse Adult

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

### EKKI má nota Elvanse Adult

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir lisdexamfetamíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)
- ef þú tekur lyf sem kallast „mónóamín-oxídasahemill“ (MAO-hemill) sem notað er við þunglyndi, eða ef þú hefur tekið MAO-hemil á síðustu 14 dögum
- ef þú ert með skjaldkirtilsvandamál
- ef þú finnur fyrir óvenjulegum spennings-, ofvirkni eða hömluleysi
- ef þú hefur einhvern tíma verið með hjartavandamál - eins og hjartaáfall, óreglulegan hjartslátt, verki og óþægindi í brjósti, hjartabilun, hjartasjúkdóm eða meðfæddan hjartasjúkdóm
- ef þú ert með háan eða mjög háan blóðþrýsting eða þrængsli í æðum
- ef þú ert með aukinn þrýsting í auga (gláku)

Ekki má nota Elvanse Adult ef eitthvað af ofantöldu á við um þig. Ef þú ert ekki viss skaltu leita ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en Elvanse Adult er notað. Það er vegna þess að Elvanse Adult getur aukið á þessi einkenni.

### Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en Elvanse Adult er notað:

- ef þú hefur misnotað lyfseðilsskyld lyf eða fíkniefni
- ef þú hefur verið með nýrnvandamál
- ef þú hefur fengið flog (krampa, rykkjakrampa eða flogaveiki) eða óeðlilegt heilalínurit (EEG)
- ef þú fyrirhugar þungun eða ert þunguð (sjá kaflann „Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi“)
- ef þú færð endurtekna kippi sem erfitt er að hafa stjórn á í einhvern hluta líkamans eða ef þú endurtekur hljóð og orð
- ef þú ert með háan blóðþrýsting
- ef þú ert með fjölskyldu- eða sjúkrasögu um óreglulegan hjartslátt (sem sést á hjartalínuriti), eða ert með sjúkdóm og/eða færð meðferð sem eykur tilhneigingu til óreglulegs hjartsláttar eða ójafnvægi blóðsalta
- ef þú ert með hjartavandamál sem ekki kemur fram í kaflanum „Ekki má nota“ hér að ofan
- ef þú ert með geðræn vandamál. Þau geta m.a. verið:
  - skapsveiflur (frá geðhæð yfir í geðlægð - kallast „geðhvarfasýki“)
  - nýtilkomin árásarhvöt eða óvingjarnleiki (fjandsamleiki) eða árásarhvöt þín versnar að sjá, heyra eða upplifa hluti sem eru ekki til staðar (ofskynjanir)

- að trúa hlutum sem eru ekki sannir (ranghugmyndir)
- að finna fyrir óvenjulegri tortryggni (vænissýki)
- að finna fyrir æsingi, kvíða eða taugaspennu
- að finna fyrir þunglyndi eða sektarkennd

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita ef eitthvað af ofangreindu á við um þig áður en meðferð hefst. Það er vegna þess að Elvanse Adult getur aukið á þessi einkenni. Læknirinn vill fylgjast með því hvernig lyfið verkar á þig.

Elvanse Adult getur valdið hjartsláttaróreglu hjá sumum sjúklingum. Ef þú finnur fyrir hjartsláttarónotum eða óreglulegum hjartslætti á meðferðartímabilinu skaltu láta lækinn vita án tafar. Hættan á hjartakvillum getur aukist með hækkandi skammti. Því á að fylgja ráðlagðri skömmtun.

### **Prófanir sem læknirinn gerir áður en þú byrjar að taka Elvanse Adult**

Þessar prófanir eru til að ákveða hvort Elvanse Adult sé rétta lyfið fyrir þig. Læknirinn spyr þig um:

- önnur lyf sem þú tekur
- hvort um sé að ræða fjölskyldusögu um skyndilegt óútskýrt dauðsfall
- aðra sjúkdóma (eins og hjartavandamál) sem þú eða fjölskylda þín kunnið að hafa
- líðan þína, eins og hvort þú finnur fyrir hamingju eða depurð, hvort þú sért með undarlegar hugsanir eða hvort þú hafir áður fundið fyrir þessum tilfinningum
- hvort um sé að ræða fjölskyldusögu um „vöðvakvik“ (endurtekna kippi sem erfitt er að hafa stjórn á í einhverjum hluta líkamans eða ef þú endurtekur hljóð og orð)
- geðræn vandamál eða hegðunarvandamál sem þú eða aðrir fjölskyldumeðlimir hafa verið með. Læknirinn skoðar geðheilsusögu þína og athugar hvort einhver í fjölskyldunni sé með sögu um sjálfsvíg, geðhvarfasýki (skapsveiflur frá geðhæð yfir í geðlægð) eða þunglyndi.

Mikilvægt er að þú veitir eins miklar upplýsingar og þú getur. Það hjálpar læknum að ákveða hvort Elvanse Adult sé rétta lyfið fyrir þig. Læknirinn gæti ákveðið að aðrar læknisfræðilegar prófanir séu nauðsynlegar áður en byrjað er að taka lyfið.

### **Notkun annarra lyfja samhliða Elvanse Adult**

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

**EKKI** taka Elvanse Adult ef þú:

- tekur lyf sem heitir „mónóamín-oxídasahemill“ (MAO-hemill) sem notað er við þunglyndi, eða ef þú hefur tekið MAO-hemil á síðustu 14 dögum. Ef þú tekur MAO-hemil með Elvanse Adult getur það valdið skyndilegri hækkun á blóðþrýstingnum. Læknirinn eða lyfjafræðingur geta sagt þér hvort þú takir lyf sem er MAO-hemill.

Elvanse Adult og sum önnur lyf geta haft áhrif á hvert annað. Ef þú tekur eitthvert eftirtalinna lyfja skaltu ráðfæra þig við lækinn eða lyfjafræðing áður en þú tekur Elvanse Adult:

- lyf við alvarlegum geðrænum vandamálum
- lyf sem notuð eru til að lækka eða hækka blóðþrýsting
- lyf sem notuð eru við skurðaðgerðir, eins og verkjalyf
- lyf við hósta og kvefi. Sum þeirra innihalda lyf sem geta haft áhrif á blóðþrýstinginn, því er mikilvægt að leita ráða hjá lyfjafræðingnum þegar þú kaupir eitthvað af þessum vörum
- lyf sem geta haft áhrif á sýrustig þvagsins, eins og C-vítamín (askorbínsýra) eða natríumbíkarbónat (til dæmis í lyfjum við meltingartruflunum).

Ef þú ert ekki viss um hvort lyf sem þú tekur er á listanum hér að ofan, skaltu leita ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en þú tekur Elvanse Adult.

### **Lyfjapróf**

Lyfið getur gefið jákvæða niðurstöðu á lyfjaprófi.

## Meðganga og brjóstgjöf

Við meðgöngu, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá læknum áður en lyfið er notað.

Líkaminn brýtur Elvanse Adult niður í önnur efni sem geta farið yfir fylgjuna og í brjóstamjólkina. Fyrirliggjandi upplýsingar um notkun Elvanse Adult á fyrstu þremur mánuðum meðgöngu benda ekki til aukinnar hættu á meðfæddri vansköpun hjá barninu, en hættan á meðgöngueitrun (ástand sem kemur yfirleitt upp eftir 20 vikna meðgöngu og einkennist af háum blóðþrýstingi og prótíni í þvagi) og fyrirburafæðingu kann að vera meiri. Nýburar sem voru útsettir fyrir amfetamíni á meðgöngu geta fengið fráhrarfseinkenni (skjálfta, pirring, herta vöðvaspennu). Þú skalt ekki nota lyfið á meðgöngu nema lækningin hafi sérstaklega ráðlagt þér það eða hafa barn á brjósti meðan þú tekur Elvanse Adult.

## Akstur og notkun véla

Þú gætir fundið fyrir sundli, átt erfitt með sjónskerpu eða verið með óskýra sjón þegar þú tekur Elvanse Adult. Ef þetta gerist er hættulegt að gera hluti eins og að aka eða nota vélar.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

## Elvanse Adult inniheldur natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverju hylki, þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust.

## 3. Hvernig nota á Elvanse Adult

### Hversu mikið á að taka

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og lækningin hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá læknum eða lyfjafræðingi.

Elvanse Adult er eingöngu ætlað þér. Ekki má gefa það öðrum, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.

Hámarksskammturinn er 70 mg á dag.

### Hvernig nota á Elvanse Adult

- Taktu Elvanse Adult á morgnana fyrir morgunverð. Það má taka með eða án matar.
- Tvær leiðir eru til að taka Elvanse Adult:

- Gleyptu hylkið í heilu lagi með sopa af vatni
- Opnaðu hylkið og tæmdu innihaldið í:
  - Mjúka fæðu eins og jógúrt
  - Glas af vatni eða appelsínusafa

Notaðu skeið til að mylja köggla og hrærðu Elvanse Adult saman við jógúrt, vatn eða appelsínusafa þar til það hefur blandast saman að fullu. Borðu allt jógúrtið eða drekktu allt vatnið eða appelsínusafann strax eftir blöndun með Elvanse Adult. Ekki má geyma það. Ekki hafa áhyggjur þótt filma sé í glasinu eða ílátinu á eftir - þetta er ekki virka innihaldsefnið.

### Skammtur

- Lækningin segir þér hvaða styrkleika hylkis þú átt að taka (Elvanse Adult 30 mg, 50 mg eða 70 mg hylki) á hverjum degi.
- Ráðlagður skammtur í upphafi meðferðar er 30 mg. Síðar gæti lækningin aukið hann í 50 mg eða 70 mg.
- Ef þú ert með nýmatengd vandamál gæti lækningin minnkað skammtinn.
- Ekki skipta skammtinum sem er í hylkinu, taktu allt innihald hylkisins. Ekki taka minna en eitt hylki á dag.

## **Ef þér líður ekki betur eftir 1 mánaðar meðferð**

Ef þér líður ekki betur skaltu láta lækinn vita. Þú gætir þurft aðra meðferð.

## **Ef Elvanse Adult er ekki notað á réttan hátt**

- Ef Elvanse Adult er ekki notað á réttan hátt getur það valdið óeðlilegri hegðun. Þér gæti líka byrjað að líða eins og þú þurfir lyfið í öðrum tilgangi en að hjálpa til við ADHD. Láttu lækinn vita ef þú hefur einhvern tíma átt við vandamál að stríða hvað varðar áfengi, lyfseðilsskyld lyf eða fíkniefni.

## **Ef tekinn er stærri skammtur af Elvanse Adult en mælt er fyrir um**

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Einkenni ofskömmtnar geta verið: Eirðarleysi, skjálfti, auknar ósjálfráðar hreyfingar, vöðvakippir, hröð öndun, rugl, tilhneiging til að berjast eða deila, að sjá, finna fyrir eða heyra hluti sem eru ekki raunverulegir (ofskynjanir), skelfingarástand, hár hiti eða niðurbrot vöðva. Þreyta og þunglyndi geta fylgt í kjölfarið. Hugsanlegt er að fram komi breytingar á hjartslætti (hægur, hraður eða óreglulegur), hár eða lágur blóðþrýstingur, blóðrásarbilun, kippir og dá. Ógleði eða uppköst, niðurgangur og magakrampar geta einnig komið fram.

## **Ef gleymist að taka Elvanse Adult**

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Ef þú gleymir skammti skaltu bíða til næsta dags. Forðastu að taka það síðdegis vegna möguleika á svefntruflunum (svefnleysi).

## **Ef hætt er að nota Elvanse Adult**

Ef þú hættir að taka lyfið geta ADHD-einkenni komið aftur.

Ekki hætta að taka lyfið án samráðs við lækinn. Þú skalt ekki hætta skyndilega að taka lyfið á eigin spýtur.

## **Það sem lækinn gerir þegar þú tekur Elvanse Adult**

### **Lækinn gerir nokkrar prófanir**

- áður en þú byrjar - til að tryggja að Elvanse Adult sé öruggt fyrir þig og muni koma að gagni.
- eftir að þú byrjar - lækinn mun gera prófanir a.m.k. á 6 mánaða fresti, en hugsanlega oftar. Einnig þarf að gera þessar prófanir ef skammtinum er breytt. Þessar prófanir fela í sér:
  - eftirlit með matarlyst
  - þyngdarmælingu
  - mælingu á blóðþrýstingi og hjartsláttartíðni
  - athugun á því hvort þú eigir við vandamál að stríða hvað varðar skap, hugarástand eða einhverjar aðrar óvenjulegar tilfinningar eða hvort slíkt hefur versnað á meðan þú tekur Elvanse Adult.

## **Langtímameðferð**

Ekki þarf að taka Elvanse Adult til frambúðar. Ef þú tekur Elvanse Adult í meira en eitt ár, á lækinn að stöðva meðferðina í stuttan tíma. Það leiðir í ljós hvort þú þurfir enn lyfið.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

## **4. Hugsanlegar aukaverkanir**

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Lækinn mun ræða við þig um þessar aukaverkanir.

**Sumar aukaverkanir geta verið alvarlegar. Ef þú færð einhverja af eftirtöldum aukaverkunum, skaltu tafarlaust leita læknis:**

**Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 fullorðnum)**

- óreglulegur hjartsláttur (hjartsláttarónot)
- brjóstverkir (geta verið merki um hjartasjúkdóm)

**Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 fullorðnum)**

- óvenjulegur spenningur, ofvirkni eða hömluleysi (oflæti)
- ofnæmisviðbrögð (ofnæmi)

**Tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirbyggjandi gögnum**

- að sjá, upplifa eða heyra hluti sem eru ekki raunverulegir (ofskynjanir)
- alvarleg ofnæmisviðbrögð sem einkennast af miklu blóðþrýstingsfalli, öndunarerfiðleikum og ofsakláða/kláða (bráðaofnæmisviðbrögð)
- að sjá, upplifa eða heyra hluti sem eru ekki raunverulegir, vænisýki, ranghugmyndir (geðrofsлотur)
- flog (krampar)
- hjartað slær í óeðlilegum takti, lífshættulegur óreglulegur hjartsláttur (sést á hjartalínuriti). Sjá kafla 2, Varnaðarorð og varúðarreglur
- ofnæmislifarskaði sem getur komið fram sem gulnun augna og/eða húðar (eósínófil lifrabólga)
- bólga í andliti, tungu eða hálsi; kyngingarerfiðleikar; ofsakláði og öndunarerfiðleikar (ofsabjúgur) eða alvarleg húðútbrot í húð og slímhúð, með blöðrum eða án, eða húðerting, sár eða bólgur í munni, hálsi, augum, nefi og umhverfis kynfæri (Stevens-Johnson heilkenni)
- mæði eða þroti á fótleggjum (einkenni um sjúkdóm í hjartavöðva)

Ef þú færð einhverja af ofangreindum aukaverkunum, skaltu tafarlaust leita læknis.

**Aðrar aukaverkanir eru eftirfarandi. Ef þær verða alvarlegar skaltu láta lækinn eða lyfjafræðing vita:****Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 fullorðnum)**

- minnkuð matarlyst
- erfiðleikar við að sofa
- munnþurrkur
- höfuðverkur

**Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 fullorðnum)**

- æsingur, taugaspenna, kvíði eða piringur
- óvenjuleg þreyta eða eirðarleysi
- vangeta til að ná eða viðhalda stinningu eða breytingar á kynhvöt
- svimi
- stjórnlausir rykkir, hristingur, skjálfti eða óvenjuleg virkni
- endurteknir kippir sem erfitt er að hafa stjórn á í einhverjum hluta líkamans eða endurtekning á hljóðum og orðum (vöðvakvik)
- skapsveiflur
- hár blóðþrýstingur, hraður eða óreglulegur hjartsláttur (hraðtaktur)
- erfiðleikar við öndun
- ógleði eða niðurgangur
- hægðatregða
- þyngdartap
- mikil svitamyndun
- magaverkir
- tannagnístur

**Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 fullorðnum)**

- óhóflegt tal
- þunglyndi, kvíði, depurð eða óróleiki (vanlíðan)
- óhófleg hamingjutilfinning eða spenningur (sæluvíma)
- óhóflegt kropp í húð

- stjórnlausir vöðvakippir eða rykkir í líkamanum
- óvenju mikil syfja
- kláði, útbrot eða upphleypt rauð kláðaútbrot (ofsakláði)
- óskýr sjón
- hár hiti (sótthiti)
- uppköst
- málmbragð eða breytingar á bragðskyni (bragðskynstruflun)
- yfirlið

#### **Tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum**

- mikil víkkun sjáaldra
- árásarhvöt
- Lélegt blóðflæði sem veldur því að tær og fingur verða dofnir og föllir (Raynauds heilkenni)

#### **Áhrif á þyngd**

Elvanse Adult getur valdið þyngdartapi hjá sumu fólki.

Læknirinn mun fylgjast með þyngdinni og hversu vel þú borðar. Ef þú ert að léttast gæti læknirinn stöðvað meðferð með Elvanse Adult í stuttan tíma.

#### **Tilkynning aukaverkana**

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, [www.lyfjastofnun.is](http://www.lyfjastofnun.is). Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

### **5. Hvernig geyma á Elvanse Adult**

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á glasinu og öskjunni á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið við lægri hita en 25°C.

Ekki skal nota lyfið ef hylkin líta út fyrir að vera skemmd.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

### **6. Pakkningar og aðrar upplýsingar**

#### **Elvanse Adult inniheldur**

Virka innihaldsefnið er lisdexamfetamíntvímesýlat.

Hvert 30 mg hylki inniheldur 30 mg lisdexamfetamíntvímesýlat, sem jafngildir 8,9 mg af dexamfetamíni.

Hvert 50 mg hylki inniheldur 50 mg lisdexamfetamíntvímesýlat, sem jafngildir 14,8 mg af dexamfetamíni.

Hvert 70 mg hylki inniheldur 70 mg lisdexamfetamíntvímesýlat, sem jafngildir 20,8 mg af dexamfetamíni.

Önnur innihaldsefni eru:

- Innihald hylkis: örkristallaður sellulósi, kroskarmellósanatríum, magnesíumsterat
- Hylkisskel: matarlím, títantvíoxíð (E171)
  - 30 mg hylkið inniheldur einnig erytrósín (E127)
  - 50 mg hylkið inniheldur einnig skærblátt FCF (E133)
  - 70 mg hylkið inniheldur einnig skærblátt FCF (E133) og erytrósín (E127)
- Prentblek: shellac, kalíumhýdroxíð, svart járnnoxíð E172, própýlenglýkól.

### Lýsing á útliti Elvanse Adult og pakkingastærðir

Hörð hylki

30 mg hylkin eru með hvítum ógagnsæjum botni og bleiku ógagnsæju loki, með áprentuðu „S489“ og „30 mg“ með svörtu bleki.

50 mg hylkin eru með hvítum ógagnsæjum botni og bláu ógagnsæju loki, með áprentuðu „S489“ og „50 mg“ með svörtu bleki.

70 mg hylkin eru með bláum ógagnsæjum botni og bleiku ógagnsæju loki, með áprentuðu „S489“ og „70 mg“ með svörtu bleki.

Pakkingastærðir: 28 eða 30 hylki. Ekki er víst að allar pakkingastærðir séu markaðssettar.

### Markaðsleyfishafi og framleiðandi:

Takeda Pharmaceuticals International AG Ireland Branch

Block 3 Miesian Plaza, 50 – 58 Baggot Street Lower, Dublin 2, D02 Y754, Írland

Sími: +80066838470

Netfang: [medinfoEMEA@takeda.com](mailto:medinfoEMEA@takeda.com)

### Framleiðandi:

Takeda GmbH

Production site Oranienburg

Lehnitzstraße 70 98

16515 Oranienburg

Þýskaland

### Þetta lyf hefur fengið markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins og í Bretlandi (Norður-Írland) undir eftirfarandi heitum:

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Austurríki                  | Elvanse Erwachsene |
| Danmörk                     | Aduvanz            |
| Finnland, Þýskaland, Ísland | Elvanse Adult      |
| Noregur                     | Aduvanz            |
| Spánn                       | Elvanse Adultos    |
| Svíþjóð                     | Elvanse Vuxen      |
| Bretland (Norður-Írland)    | Elvanse Adult      |

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í júlí 2022.