

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Xylocain ukonserveret 20mg/g hlaup lídókaínhýdróklóríð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og lækningurinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.
- Látið lækningurinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.
- Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Xylocain ukonserveret hlaup og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Xylocain ukonserveret hlaup
3. Hvernig nota á Xylocain ukonserveret hlaup
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Xylocain ukonserveret hlaup
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Xylocain ukonserveret hlaup og við hverju það er notað

Xylocain ukonserveret er staðdeyfilyf. Það virkar á nokkrum mínútum.

Xylocain ukonserveret hlaup má nota hjá fullorðnum og börnum í öllum aldurshópum.

Xylocain ukonserveret hlaup er notað til að deyfa staðbundið fyrir ýmsar skoðanir í endaþarmi, öndunarvegi eða þegar leggur er settur upp.

Það má einnig nota Xylocain ukonserveret til að deyfa sársauka af völdum bólgu í þvagblöðru og þvagrás og til verkjædefingrar eftir umskurð hjá drengjum.

2. Áður en byrjað er að nota Xylocain ukonserveret hlaup

Verið getur að lækningurinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Xylocain ukonserveret hlaup

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir lídókaíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).
- ef um er að ræða ofnæmi fyrir staðdeyfilyfjum af sama flokki og Xylocain ukonserveret (t.d. prílókaíni eða cinchokaíni).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Gæta skal varúðar þegar Xylocain ukonserveret hlaup er notað í munn og háls þar sem deyfingin getur truflað kyngingu. Því skal ekki borða fyrstu 2 klst. eftir deyfinguna. Ef gómur og tunga er tilfinningalaus er einnig hætt á að viðkomandi bíti sig.

Leitið ráða hjá lækningurinum áður en Xylocain ukonserveret hlaup er notað:

- ef þú ert með hjartsláttartruflanir
- ef þú ert með hjartabilun
- ef þú ert með lifrarkvilla
- ef þú ert með nýrnakvilla
- ef þú ert með flogaveiki eða aðra taugasjúkdóma
- ef þú ert með porfýríu sem er sjaldgæfur efnaskiptasjúkdómur

- ef ætlunin er að bera Xylocain ukonserveret hlaup á opin sár, slímhúð, brunasár eða bólgin svæði.

Notkun annarra lyfja samhliða Xylocain ukonserveret hlaupi

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð, einnig þau sem fengin eru án lyfseðils, keypt erlendis, náttúrulyf, sterk vítamín og steinefni.

Meðferð með Xylocain ukonserveret hlaupi getur haft áhrif á meðferð með öðrum lyfjum og önnur lyf geta haft áhrif á meðferðina með Xylocain ukonserveret hlaupi:

- Ef þú notar lyf við hjartsláttartruflunum (t.d. amiodaron) skal hafa samband við lækni áður en þú notar Xylocain ukonserveret hlaup.
- Gæta skal varúðar við notkun Xylocain ukonserveret hlaups með öðrum svipuðum staðeyfilyfjum.

Notkun Xylocain ukonserveret hlaups með mat eða drykk

Nota má Xylocain ukonserveret hlaup með mat og drykk. Ef Xylocain ukonserveret hlaup hefur verið notað í munn eða kok má ekki borða fyrir en 2 tímum eftir deyfinguna til að koma í veg fyrir ásvelgingu.

Meðganga og brjóstgjöf

Við meðgöngu, brjóstgjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Meðganga:

Það má nota Xylocain ukonserveret hlaup á meðgöngu.

Brjóstgjöf:

Nota má Xylocain ukonserveret hlaup meðan barn er á brjósti. Ekki má nota Xylocain ukonserveret hlaup á geirvörtunartíð fyrir gjöf. Ef Xylocain ukonserveret hlaup hefur verið borið á geirvörtunartíð er mjög mikilvægt að það sé hreinsað vel af áður en barnið er sett á brjóst.

Akstur og notkun véla

Við ráðlagða skammta hefur Xylocain ukonserveret hlaup ekki áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3. Hvernig nota á Xylocain ukonserveret hlaup

Venjulegur skammtur er

Fullorðnir:

Ef læknir hefur ávísað Xylocain ukonserveret hlaupi á að fylgja fyrirmælum hans.

Annars á að nota það magn sem þarf til að draga úr verkjum. Berið þunnt lag af hlaupinu á það húðsvæði sem á að meðhöndla. Bíðið eins lengi og kostur er með að endurtaka meðferðina og gerið það ekki nema þess gerist þörf.

Börn:

Ekki á að nota Xylocain ukonserveret hlaup handa börnum yngri en 2 ára nema læknir hafi ávísað því.

Skammtar handa börnum yngri en 12 ára eiga ekki að vera stærri en 6 mg/kg.

Handa barni sem vegur:

- 15 kg má í mesta lagi nota 4,5 g af hlaupi í hvert skipti.
- 20 kg má í mesta lagi nota 6 g af hlaupi í hvert skipti.
- 30 kg má í mesta lagi nota 9 g af hlaupi í hvert skipti.

Ekki á að nota Xylocain ukonserveret oftar en 4 sinnum á sólarhring.

Aldraðir:

Nauðsynlegt getur verið að breyta skömmtum. Fylgið fyrirmælum læknisins.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Einkenni ofskömmtunar: dofi í vörum og í kringum munn, rugl, sundl, og í einstaka tilvikum sjóntruflanir.

Til að koma í veg fyrir alvarlegar aukaverkanir skal taka þessi merki ofskömmtunar alvarlega og hætta notkun Xylocain ukonserveret hlaups.

Ef gleymist að nota Xylocain ukonserveret hlaup

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef Xylocain ukonserveret hlaup er notað handa barni á að hafa í huga að ekki má nota það oftar en 4 sinnum á sólarhring.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir:

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fram hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sem nota lyfið):

- Skyndileg ofnæmisviðbrögð (innan mínútna eða klukkustunda) t.d. útbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið (bráðaofnæmi). Getur verið lífshættulegt. Hringið í 112.

Ekki alvarlegar aukaverkanir:

Algengar aukaverkanir (geta komið fram hjá 1 til 10 af hverjum 100 sem nota lyfið):

- Særindi í hálsi eftir aðgerð þegar barkaslanga hefur verið smurð með lyfinu.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fram hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sem nota lyfið):

- Ofnæmi t.d. útbrot.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Xylocain ukonserveret hlaup

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið við lægri hita en 25°C. Xylocain ukonserveret hlaup má ekki frjósa.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Xylocain ukonserveret hlaup inniheldur

- Virka innihaldsefnið er lídókaín hýdróklóríð.
- Önnur innihaldsefni eru hýprómellósi, natríumhýdroxíð, saltsýra, og vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Xylocain ukonserveret hlaups og pakkningastærðir

Útlit

Xylocain ukonserveret hlaup er tært eða næstum tært, lítið eitt litað hlaup.

Pakkningastærðir

Xylocain ukonserveret 20 mg/g, hlaup fæst í pakkningu með 10 áfylltum 10 g sprautum. Pakkningin er dauðhreinsuð.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Aspen Pharma Trading Limited,
3016 Lake Drive,
Citywest Business Campus,
Dublin 24,
Írland

Framleiðandi

Meribel Pharma Karlskoga AB, Karlskoga, Svíþjóð

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í október 2025.

Upplýsingar sem hægt er að nálgast annars staðar

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar, <http://www.serlyfjaskra.is>.