

ÖRYGGISKORT FYRIR SKJÚKLINGA

ÖRYGGISKORT FYRIR SJÚKLINGA

Edoxaban WH

filmhúðaðar töflur

edoxaban

Vinsamlegast hafið þetta kort ávallt meðferðis.

Sýnið ávallt heilbrigðisstarfsmönnum, lyfjafræðingi, skurðlækni og tannlækni kortið fyrir lækni meðferð eða aðgerð.

UPPLÝSINGAR UM SJÚKLING

Nafn sjúklings:

Fæðingardagur:

Ef um bráðatilvik er að ræða, vinsamlegast hafið samband við:

Nafn:

Símanúmer:

UPPLÝSINGAR UM MEÐFERÐ

(Skal fyllt út af lækni)

Edoxaban WH hefur verið ávísað einu sinni á sólarhring í skammtinum: mg

Meðferð hefst: / (mm/áá)

Blóðflokkur:

Önnur lyf/sjúkdómar:

UPPLÝSINGAR UM ÞANN SEM ÁVÍSAR LYFINU

Ef þörf er á frekari upplýsingum eða ef um bráðatilvik er að ræða, vinsamlegast hafið samband við:

Nafn læknis:

Símanúmer, stimpill læknis:

Undirskrift læknis:

UPPLÝSINGAR ÆTLAÐAR HEILBRIGÐISSTARFSMÖNNUM

- Edoxaban WH er segavarnarlyf til inntöku, hemill á storkuþátt Xa
- Þegar þörf er á aðgerð skal stöðva meðferð með Edoxaban WH að minnsta kosti 24 klst. fyrir aðgerð og gæta skal viðeigandi varúðar.
- Edoxaban WH getur aukið hættuna á blæðingum. Ef um klínískt mikilvæga blæðingu er að ræða skal stöðva meðferð samstundis.
- Storkupróf svo sem INR (international normalised ratio), prótrombíními (PT), og virkjaður hlutatrombóplastími (aPTT) eru ekki gagnleg til mælingar á virkni Edoxaban WH. Hins

vegar getur kvörðuð magngreining á virkni gegn storkupætti Xa verið gagnleg við klíniska ákvarðanatöku.

Vísað er til nánari upplýsinga í samantekt á eiginleikum lyfs (SmPC).

UPPLÝSINGAR UM MEÐFERÐINA

Þér hefur verið ávísað Edoxaban WH, segavarnarlyfi, sem þynnir blóðið og hjálpar til við að koma í veg fyrir myndun blóðtappa. Mikilvægt er að þú takir lyfið nákvæmlega eins og læknirinn hefur sagt til um.

- Ef þú gleymir skammti áttu að taka hann strax og halda síðan áfram daginn eftir eins og venjulega – ekki taka tvöfaldan ávísaðan skammt á sama degi
- Ekki byrja að taka önnur lyf (þar með talið lyf sem fást án lyfseðils) án samráðs við lækninn.
- Ekki hætta að taka Edoxaban WH án samráðs við lækninn þar sem það getur aukið hættuna á því að þú fáið blóðtappa.
- Vinsamlegast lestu fylgiseðilinn sem er að finna í öllum Edoxaban WH pakkningum.

HVENÆR LEITA SKAL LÆKNIS

BLÆÐINGARHÆTTA

Taka segavarnarlyfja svo sem Edoxaban WH getur aukið hættu á blæðingum. Því er mikilvægt að þekkja möguleg einkenni blæðinga og hafa **samstundis** samband við lækninn ef eitthvað af eftirtöldu kemur fyrir:

- Marblettir eða blæðingar í húð
- Blóð í þvagi
- Hóstað er upp blóði
- Kastað er upp blóði eða einhverju sem líkist kaffikorgi
- Blóðnasir eða skurðir eru lengi að hætta að blæða
- Tjörulitaðar hægðir
- Sundl eða skyndilegur höfuðverkur
- Óútskýrð þreyta
- Óeðlilegar blæðingar frá leggöngum, þ.m.t. meiri blæðingar en venjulega eða blæðingar standa í lengri tíma.

Vinsamlegast talaðu við lækninn ef þú færð einhver óvenjuleg einkenni.