

FYLGISEDILL
Bimectin Horse Oral Paste 18,7 mg/g
PASTA TIL INNTÖKU FYRIR HROSS

1. HEITI OG HEIMILISFANG HANDHAFA MARKAÐSLEYFIS OG ÞESS FRAMLEIÐANDA SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT, EF ANNAR

Bimeda Animal Health Limited
2,3 &4 Airton Close
Tallaght,
Dublin 24, Írlandi

2. HEITI DÝRALYFS

Bimectin Horse Oral Paste 18,7 mg/g, pasta til inntöku fyrir hross. Ivermectín.

3. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Ivermectín 18,7 mg/g.

Hver dæla af Bimectin Paste pasta til inntöku inniheldur 6,42 g af gulu, hlaupkenndu pasta með jafnri áferð.

Meðal hjálparefna eru: Maís olía (Ph.Eur), Pólýsorbate 80 (Ph.Eur), vatnsfrí kísilkvoða, (Ph.Eur) og eplabragðefni.

4. ÁBENDING(AR)

Bimectin Horse Oral Paste er ætlað til meðferðar á sjúkdómum í hrossum af völdum eftirfarandi sníkjudýra:

Strongyles, stórir (large strongyles).

Strongylus vulgaris (fullþroska þráðormar og lirfur á æðastigi)

S. edentatus (fullþroska þráðormar og lirfur á vefjastigi)

S. equinus (fullþroska)

Triodontophorus spp. (fullþroska)

Triodontophorus brevicauda

Triodontophorus serratus

Craterostomum acuticaudatum (fullþroska)

Strongyles, litlir (small strongyles) (fullþroska og ófullþroska) þ.á.m. benzimidazól-ónæmir stofnar.

Coronocyclus spp.

Coronocyclus coronatus

Coronocyclus labiatus

Coronocyclus labratus

Cyathostomum spp.

Cyathostomum catinatum

Cyathostomum pateratum

Cylicocyclus spp.

Cylicocyclus ashworthi

Cylicocyclus elongatus

Cylicocyclus insigne

Cylicocyclus leptostomum

Cylicocyclus nassatus

Cylicocyclus radiatus

Cylicostephanus spp.

Cylicostephanus asymmetricus

Cylicostephanus bidentatus
Cylicostephanus calicatus
Cylicostephanus goldi
Cylicostephanus longibursatus
Cylicostephanus minutus
Cylicodontophorus spp.
Cylicodontophorus bicornatus
Gyalocephalus capitatus
Parapoteriostomum spp.
Parapoteriostomum euproctus
Parapoteriostomum mettami
Petrovinema spp.
Petrovinema poculatum
Poteriostomum spp.
Poteriostomum imparidentatum

Lungnaormar (fullþroska og ófullþroska)
Dictyocaulus arnfieldi

Njálgur (Pinworms) (fullþroska og ófullþroska)
Oxyuris equi

Spóluormar (Ascarids) (fullþroska og ófullþroska)
Parascaris equorum

Hárormar (Hairworms) (fullþroska)
Trichostrongylus axei

Stórmynntir magaormar (Large-mouth stomach worms) (fullþroska)
Habronema muscae

Hálsþráðormar (Neck threadworms) (microfilariae)
Onchocerca spp.

Þráðormar í meltingarfærum (Intestinal threadworms) (fullþroska)
Strongyloides westeri

Magalirfur (stomach bots)
Gastrophilus spp. Á þeim stigum sem lifa í munni og maga

5. FRÁBENDINGAR

Engar þekktar

6. AUKAVERKANIR

Sum hross með alvarlega sýkingu af *Onchocerca microfilariae* hafa fengið bjúg og kláða eftir meðhöndlun, sem talið er vera vegna dauða mikils fjölda hálsþráðorma (microfilariae). Þessi einkenni hverfa innan nokkurra daga, en ráðlegt getur verið að meðhöndla þau.

7. DÝRATEGUND(IR)

Hross

8. SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Gefið um munn í ráðlögðum skammti, sem er 0,2 mg af ívermektíni fyrir hvert kg líkamsþunga. Sérhver dæla inniheldur 120 mg af ívermektíni, sem er nægilegt til að meðhöndla 600 kg líkamsþunga.

Skammtaleiðbeiningar

Á stimpli dælnnar eru merki, sem tákna, að sé stimplinum ýtt inn um eitt bil, tæmist úr dælnni lyf hæfilegt fyrir 100 kg líkamsþunga. Snúið stilliskífurni ¼ úr hring, færið skífuna að þeirri þyngd, sem er hæfileg fyrir gripinn. Læsið stillingunni með því að snúa skífurni ¼ úr hring. Við inngjöf skal gengið úr skugga um, að ekkert fóður sé uppi í hrossinu. Takið plasttappann framan af dælnni og ýtið henni varlega inn um munnvik hrossins og inn á milli framtanna og jaxla aftur á tunguna. Þrýstið á stimpilinn svo lyfið renni aftur á tunguna. Reisið haus hrossins stundarkorn eftir lyfjagjöf, svo það geti ekki japlað lyfinu úr sér.

Sníkjudýravarnir

Sníkjudýravarnir ber að viðhafa reglulega hjá öllum hrossum, sérstaklega merum, folöldum og árgömlum trippum. Folöld skulu fá fyrstu meðferðina 6 til 8 vikna gömul, og síðan reglulega meðferð eftir því sem við á.

Þetta lyf er mjög virkt gegn þráðormum (nematodes) og lirfum hrossavembu (bots) í meltingarvegi, húð og lungum hrossa. Regluleg meðferð dregur úr líkum á æðabólgu og iðrakveisu af völdum *Strongylus vulgaris*. Þar sem lyfið er mjög breiðvirkt hentar það vel sem aðallyf til sníkjudýravarna og einnig sem aðallyf í reglubundnum vörnum.

9. LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF

Gefið um munn í ráðlögðum skammti, sem er 0,2 mg af ívermektíni fyrir hvert kg líkamsþunga. Sérhver dæla inniheldur 120 mg af ívermektíni, sem er nægilegt til að meðhöndla 600 kg líkamsþunga.

Skammtaleiðbeiningar

Á bullustöng dælnnar eru merki, sem tákna, að sé bullunni ýtt inn um eitt bil, tæmist úr dælnni lyf hæfilegt fyrir 100 kg líkamsþunga. Snúið stilliskífurni ¼ úr hring, færið skífuna að þeirri þyngd, sem er hæfileg fyrir gripinn. Læsið stillingunni með því að snúa skífurni ¼ úr hring. Við inngjöf skal gengið úr skugga um, að ekkert fóður sé uppi í hrossinu. Takið plasttappann framan af dælnni og ýtið henni varlega inn um munnvik hrossins og inn á milli framtanna og jaxla aftur á tunguna. Þrýstið á bulluna svo lyfið renni aftur á tunguna. Reisið haus hrossins stundarkorn eftir lyfjagjöf, svo það geti ekki japlað lyfinu úr sér.

Sníkjudýravarnir

Sníkjudýravarnir ber að viðhafa reglulega hjá öllum hrossum, sérstaklega merum, folöldum og árgömlum trippum. Folöld skulu fá fyrstu meðferðina 6 til 8 vikna gömul, og síðan reglulega meðferð eftir því sem við á.

Þetta lyf er mjög virkt gegn þráðormum (nematodes) og lirfum hrossavembu (bots) í meltingarvegi, húð og lungum hrossa. Regluleg meðferð dregur úr líkum á æðabólgu og iðrakveisu af völdum *Strongylus vulgaris*. Þar sem lyfið er mjög breiðvirkt hentar það vel sem aðallyf til sníkjudýravarna og einnig sem aðallyf í reglubundnum vörnum.

10. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Ekki má slátra dýrum til manneldis á meðan á meðferð stendur.

Ekki má nýta sláturafurðir fyrir en eftir 34 sólarhringa frá síðustu meðhöndlun.

11. GEYMSLUSKILYRÐI

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður þessa dýralyfs

12. SÉRSTÖK VARNADARORÐ

Engin

13. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÓNOTAÐRA LYFJA EÐA ÚRGANGS, EF VIÐ Á

LYFIÐ ER MJÖG HÆTTULEGT FISKUM OG VATNALÍFVERUM. Gætið þess að lyfið eða notaðar dælur ekki yfirborðsvatn eða skurði. Umbúðum og lyfjaleif um skal farga í samræmi við reglur.

14. DAGSETNING SÍÐUSTU SAMÞYKKTAR FYLGISEÐILSINS

06/2019

Ítarlegri upplýsingar um dýralyfíð eru birtar á heimasíðu Lyfjastofnunar <http://www.serlyfjaskra.is>.

15. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Ef óskað er upplýsinga um þetta dýralyf, vinsamlega hafið þá samband við markaðsleyfishafa.