

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Dasergin 5 mg filmuhúðaðar töflur desloratadin

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og lækurinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.
- Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.
- Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Dasergin og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Dasergin
3. Hvernig nota á Dasergin
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Dasergin
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Dasergin og við hverju það er notað

Hvað er Dasergin

Dasergin inniheldur desloratadin, sem er andhistamín.

Hvernig Dasergin virkar

Dasergin er ofnæmislyf. Það hjálpar til við að hafa hemil á ofnæmisviðbrögðum og einkennum þeirra.

Hvenær nota á Dasergin

Dasergin dregur úr einkennum ofnæmisnefkvefs (bólga í nefgöngum vegna ofnæmis, t.d. heymæði eða ofnæmi fyrir rykmaurum) hjá fullorðnum og unglíngum, 12 ára og eldri. Einkennin eru hnerri, nefrennsli og kláði í nefi, kláði í efri gómi, kláði í augum, rauð eða tárbot augu.

Dasergin er einnig notað til að draga úr einkennum ofsakláða (einkenni í húð vegna ofnæmis). Einkennin eru kláði og ofsakláði.

Léttir þessara einkenna varir allan daginn og hjálpar þér við að endurheimta eðlilega starfsgetu og eðlilegan svefn.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga.

2. Áður en byrjað er að nota Dasergin

Verið getur að lækurinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð

Ekki má nota Dasergin

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir desloratadini, einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6) eða loratadini.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en Dasergin er notað.

- ef þú ert með lélega nýrnastarfsemi.
- ef þú ert með heilsufars- eða fjölskyldusögu um flog.

Börn og unglingar

Ekki gefa börnum yngri en 12 ára lyfið.

Notkun annarra lyfja samhliða Dasergin

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Ekki er vítað til að Dasergin hafi milliverkanir við önnur lyf.

Notkun Dasergin með mat, drykk og áfengi

Dasergin má taka með eða án máltíðar.

Gæta skal varúðar þegar Dasergin er tekið með áfengi.

Meðganga, brjóstagið og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagið, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Ekki er ráðlagt að nota Dasergin á meðgöngu eða á meðan á brjóstagið stendur.

Frjósemi

Engar upplýsingar eru fyrirhuguð um frjósemi hjá körlum og konum.

Akstur og notkun véla

Í ráðlögðum skammti er ekki búist við að Dasergin hafi áhrif á hæfni til aksturs eða stjórnunar véla.

Þótt flestir finni ekki fyrir syfju er ráðlagt að taka ekki þátt í athöfnum sem krefjast árvekni, eins og að aka bíl eða stjórna vélum, fyrr en þú veist hvaða áhrif lyfið hefur á þig.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Dasergin inniheldur laktósa (mjólkursykur) og natríum

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól af natríumi (23 mg í hverri töflu), þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust.

3. Hvernig nota á Dasergin

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og lækjinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá læknum eða lyfjafræðingi.

Fullorðnir og unglingar, 12 ára og eldri

Ráðlagður skammtur er ein tafla einu sinni á dag með glasi af vatni, með eða án matar.

Lyfið er ætlað til inntöku.

Gleypið töfluna í heilu lagi.

Varðandi meðferðarlengd þá mun lækjinn eða lyfjafræðingur ákvarða gerð ofnæmiskvefsins sem þú þjáist af og ákveða hve lengi þú átt að taka Dasergin.

Ef þú ert með skammvinnu ofnæmiskvef (einkennin vara í færri en 4 daga í viku eða skemur en 4 vikur) mun lækjinn eða lyfjafræðingurinn ráðleggja með meðferð sem byggir á sjúkrasögu þinni.

Ef þú ert með þrálátt ofnæmiskvef (einkennin vara í 4 daga eða fleiri í viku og lengur en í 4 vikur)

mun læk'nirinn eða lyfjafræðingurinn hugsanlega ráðleggja meðferð til lengri tíma.

Meðferðarlengd við ofsakláða er mismunandi milli sjúklinga, því skal fylgja fyrirmælum læk'nisins eða lyfjafræðings.

Leitið til læk'nis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga. Ekki taka Dasergin lengur en í 10 daga nema læk'nirinn hafi ráðlagt þér annað.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Notið Dasergin eingöngu eins og ráðlagt er í þessum fylgiseðli. Ekki er búist við alvarlegum aukaverkunum ef ofskömmtun verður fyrir slysi. Láttu samt læk'ninn eða lyfjafræðing vita ef tekið er meira af Dasergin en ráðlagt var.

Ef gleymist að taka Dasergin

Ef gleymist að taka skammt á réttum tíma, skaltu taka hann eins fljótt og hægt er og halda síðan áfram að taka lyfið samkvæmt skammtaáætlun. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læk'nisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Eftir markaðssetningu desloratadins hefur örsjaldan verið tilkynnt um alvarleg ofnæmisviðbrögð (öndunarerfiðleika, sog eða blísturhljóð við öndun, kláða, ofsakláða og bólgu). Ef þú tekur eftir einhverri af þessum alvarlegu aukaverkunum, skaltu hætta notkun lyfsins og leita bráðrar læk'nisaðstoðar strax.

Í klínískum rannsóknum hjá fullorðnum voru aukaverkanir u.þ.b. þær sömu og vegna taflna sem innihéldu lyfleysu. Þó var oftast tilkynnt um þreytu, munnþurrk og höfuðverk en eftir töku lyfleysu. Hjá unglingum var höfuðverkur algengasta aukaverkunin sem tilkynnt var um.

Tilkynnt hefur verið um eftirfarandi aukaverkanir í klínískum rannsóknum á desloratadini:

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum):

- þreyta,
- munnþurrkur,
- höfuðverkur.

Fullorðnir

Tilkynnt hefur verið um eftirfarandi aukaverkanir eftir markaðssetningu desloratadins:

Koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

- alvarleg ofnæmisviðbrögð,
- útbrot,
- hjartsláttarónot eða óreglulegur hjartsláttur,
- hraður hjartsláttur,
- magaverkur,
- ógleði,
- uppköst,
- ólga í maga,

- niðurgangur,
- sundl,
- svefnhöfgi,
- svefnleysi,
- vöðvaverkir,
- ofskynjanir,
- flog,
- eirðarleysi ásamt auknum líkamshreyfingum,
- lifrabólga,
- óeðlileg lifrarpróf.

Tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirbyggjandi gögnum

- óvenjulegur slappleiki,
- gulnun húðar og/eða augna,
- aukið næmi húðar fyrir sólarljósi, jafnvel þó mistur sé fyrir sólu, og útfjólubláu ljósi, t.d. útfjólubláu ljósi í ljósabekkjum,
- breytingar á hjartslætti,
- óvanaleg hegðun,
- árásarhneigð,
- aukin matarlyst,
- þyngdaraukning,
- depurð,
- augnþurrkur.

Börn

Tíðni ekki þekkt: ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirbyggjandi gögnum

- hægur hjartsláttur,
- breytingar á hjartslætti,
- óvanaleg hegðun,
- árásarhneigð.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunnar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Dasergin

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum (öskju og þynnu). Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Dasergin inniheldur

- Virka innihaldsefnið er desloratadin. Hver filmuhúðuð tafla inniheldur 5 mg af desloratadini.

- Önnur innihaldsefni eru örkrystallaður sellulósi, hýprómellósi, saltsýra (til að stilla sýrustig (pH)), natríumhýdroxíð (til að stilla sýrustig (pH)), maíssterkja, laktósaeinhýdrat og talkúm í töflukjarnanum og hýprómellósi, makrógól 400, laktósaeinhýdrat, títantvíoxíð (E 171) og indigótín (E 132) í filmuhúðinni. Sjá kafla 2 „Dasergin inniheldur laktósa (mjólkursykur) og natríum“.

Lýsing á útliti Dasergin og pakkningastærðir

Ljósbláar, kringlóttar, filmuhúðaðar töflur með skásniðnum brúnum (þvermál: 6,5 mm, þykkt: 2,3-3,5 mm).

Dasergin er fáanlegt í öskju með 10, 30 eða 100 filmuhúðuðum töflum. Ekki er vist að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slóvenía

Framleiðandi

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slóvenía

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið

LYFIS ehf.
Sími: 534 3500
Netfang: lyfis@lyfis.is

Þessi fylgiseðill var síðast samþykktur í júní 2026.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar, www.serlyfjaskra.is