

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Valtrex 250 mg filmuhúðaðar töflur Valtrex 500 mg filmuhúðaðar töflur valacíklóvír

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum.
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
- Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Valtrex og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Valtrex
3. Hvernig nota á Valtrex
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Valtrex
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Valtrex og við hverju það er notað

Valtrex tilheyrir flokki lyfja er kallast veirusýkingalyf. Það virkar með því að drepa eða stöðva vöxt veira sem kallast herpes simplex, hlaupabólu-ristilveirur (varicella zoster) og cýtómegalóveirur.

Valtrex er hægt að nota til að:

- meðhöndla ristil (hjá fullorðnum)
- meðhöndla sýkingar af völdum herpes simplex í húð og kynfæraherpes (hjá fullorðnum og unglíngum eldri en 12 ára). Það er einnig notað til að fyrirbyggja endurkomu þessara sýkinga.
- meðhöndla frunsur (hjá fullorðnum og unglíngum eldri en 12 ára)
- fyrirbyggja cýtómegalóveirusýkingu eftir líffæraígræðslu (hjá fullorðnum og unglíngum eldri en 12 ára)
- meðhöndla og fyrirbyggja endurteknar augnsýkingar af völdum herpes simplex (hjá fullorðnum og unglíngum eldri en 12 ára).

2. Áður en byrjað er að nota Valtrex

Verið getur að lækinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Valtrex

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir valacíklóvíri eða acíklóvíri eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).
- Ekki taka Valtrex ef ofangreint á við um þig. Ef þú ert ekki viss skaltu ræða við lækinn eða lyfjafræðing áður en þú tekur Valtrex.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en Valtrex er notað ef:

- þú hefur einhvern tíma fengið slæm húðútbrot eða húðflögnun, blöðrumyndun og/eða sár í munni eftir að hafa tekið valacíklóvír eða acíklóvír
- þú ert með nýrnavandamál
- þú ert með lifrарvandamál
- þú ert eldri en 65 ára
- ónæmiskerfi þitt er veikt

Ef þú ert ekki viss um hvort ofangreind atriði eiga við um þig skaltu ræða við lækinn eða lyfjafræðing áður en þú tekur Valtrex.

Gæta á sérstakrar varúðar við notkun Valtrex – Mikilvægar upplýsingar:

Valtrex getur valdið alvarlegum húðviðbrögðum. Hætta skal notkun Valtrex og leita tafarlaust læknishjálpur ef þú tekur eftir einhverjum einkennum sem tengjast þeim alvarlegu húðviðbrögðum sem er lýst í kafla 4.

Gætið þess að smita ekki aðra af kynfæraherpes

Ef þú tekur Valtrex til að meðhöndla eða fyrirbyggja kynfæraherpes, eða ef þú hefur fengið kynfæraherpes, skaltu samt stunda öruggt kynlíf, þ.m.t. nota smökk.

Þetta er mikilvægt til að koma í veg fyrir að þú smitir aðra.

Þú skalt ekki stunda kynlíf ef þú ert með sár eða blöðrur á kynfærum.

Notkun annarra lyfja samhliða Valtrex

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Þetta á einnig við um lyf sem fengin eru án lyfseðils, þ.m.t. náttúrulyf.

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita ef tekin eru önnur lyf sem hafa áhrif á nýrun.

Þetta eru m.a.: amínóglýkósíð, lífræn platínusambönd, skuggaefni sem innihalda joð, metótrexat, pentamídín, foskarnet, ciklósporín, takrólímus, címetidín og próbenesíð.

Látið alltaf lækinn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf ef Valtrex er tekið vegna meðferðar við ristli eða eftir líffæraígræðslu.

Meðganga og brjóstagjöf

Notkun Valtrex er yfirleitt ekki ráðlögð á meðgöngu. Ef þú ert barnshafandi, eða heldur að þú gætir verið barnshafandi, eða ef þú ráðgerir að verða barnshafandi, skaltu ekki taka Valtrex án samráðs við lækinn. Læknirinn mun meta ávinninginn af töku Valtrex fyrir þig á móti áhættunni fyrir barnið, á meðan þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Valtrex getur valdið aukaverkunum sem hafa áhrif á hæfni þína til aksturs.

→ Ekki aka eða nota vélar nema að þú sért viss um að þú finnst ekki fyrir slíkum áhrifum.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana.

Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn.

Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3. Hvernig nota á Valtrex

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá læknum eða lyfjafræðingi.

Skammturinn sem þú átt að taka ræðst af því við hverju læknirinn hefur ávísað Valtrex.

Læknirinn mun ræða þetta við þig.

Meðferð við ristli

- Venjulegur skammtur er 1.000 mg (tvær 500 mg töflur) þrisvar á dag.
- Þú skalt taka Valtrex í sjö daga.

Meðferð við frunsum

- Venjulegur skammtur er 2.000 mg (fjórar 500 mg töflur) tvisvar á dag.
- Seinni skammtinn skal taka 12 klst. (ekki innan við 6 klst.) eftir fyrsta skammtinn.
- Þú átt að taka Valtrex í aðeins einn dag (tvo skammta).

Meðferð við sýkingum af völdum herpes simplex í húð og kynfæraherpes

- Venjulegur skammtur er 500 mg (ein 500 mg tafla eða tvær 250 mg töflur) tvisvar á dag.
- Við fyrstu sýkingu skaltu taka Valtrex í fimm daga eða í allt að tíu daga ef lækningin segir þér að gera það. Við endurtekinni sýkingu er lengd meðferðar yfirleitt 3-5 dagar.

Til að fyrirbyggja endurkomu sýkinga af völdum herpes simplex eftir að þú færð þær

- Venjulegur skammtur er ein 500 mg tafla einu sinni á dag.
- Sumir einstaklingar, sem fá oft endurteknar sýkingar, gætu haft ávinning af töku einnar 250 mg töflu tvisvar á dag.
- Taktu Valtrex þar til lækningin segir þér að hætta.

Til að fyrirbyggja sýkingu af völdum cytómegalóveiru

- Venjulegur skammtur er 2.000 mg (fjórar 500 mg töflur) fjórum sinnum á dag.
- Taktu skammtana með 6 klst. millibili.
- Yfirleitt er taka Valtrex hafin eins fljótt og hægt er eftir skurðaðgerð.
- Taktu Valtrex í um 90 daga eftir skurðaðgerðina, þar til lækningin segir þér að hætta.

Lækningin gæti breytt skammtinum af Valtrex ef:

- þú ert eldri en 65 ára
 - þú ert með veikt ónæmiskerfi
 - þú ert með nýrnvandamál.
- ➔ Ræddu við lækningu áður en þú tekur Valtrex ef eitthvað af ofangreindu á við um þig.

Inntaka lyfsins

- Taktu lyfið um munn.
- Gleyptu töflurnar heilar með sopa af vatni.
- Taktu Valtrex á sama tíma dag hvern.
- Taktu Valtrex samkvæmt fyrirmælum læknisins eða lyfjafræðings.

Einstaklingar eldri en 65 ára eða með nýrnvandamál

Á meðan þú tekur Valtrex er mjög mikilvægt að þú drekkir vatn reglulega yfir daginn.

Þetta stuðlar að því að draga úr aukaverkunum sem geta haft áhrif á nýrun eða taugakerfið.

Lækningin mun fylgjast náið með þér með tilliti til slíkra aukaverkana.

Aukaverkanir á taugakerfið gætu verið m.a. rugltilfinning eða æsingur, eða óvenjumikil syfja eða svefnhöfði.

Ef tekinn er stærri skammtur af Valtrex en mælt er fyrir um

Valtrex er yfirleitt ekki skaðlegt nema þú takir of mikið nokkra daga í röð. Ef þú tekur of margar töflur gætir þú fundið fyrir ógleði, kastað upp, fengið nýrnvandamál eða fundið fyrir rugli, æsingi, skertri árvekni, séð hluti sem ekki eru til staðar eða misst meðvitund.

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Hafðu umbúðirnar meðferðis.

Ef gleymist að taka Valtrex

- Ef þú gleymir að taka Valtrex skaltu taka það um leið og þú manst eftir því. Ef hins vegar nánast er komið að næsta skammti skaltu sleppa þeim sem gleymdist.
- Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ástand sem þú þarft að vera á varðbergi gagnvart:

➔ **Hættu að nota Valtrex og leitaðu tafarlaust lækni aðstoðar ef þú færð einhver eftirfarandi einkenni:**

Alvarleg ofnæmisviðbrögð (*bráðaofnæmi*). Þau eru mjög sjaldgæf hjá einstaklingum sem taka Valtrex. Einkenni koma skyndilega fram, þ.m.t.:

- roði, húðútbrot með kláða
- þroti í vörum, andliti, hálsi og koki, sem valda öndunarerfiðleikum (*ofsabjúgur*)
- blóðþrýstingsfall sem veldur losti.

Alvarleg húðviðbrögð.

Þau koma örsjaldan fyrir hjá einstaklingum sem taka Valtrex. Einkenni eru m.a.:

- útbreidd útbrot, hár líkamshiti og eitlastækkun (lyfjaviðbrögð með fjölgun rauðkyrninga eða lyfjaofnæmisheilkenni).
- rauð, hreistruð útbreidd útbrot með ójöfnum undir húð og blöðrum sem fylgir hiti. Einkennin koma yfirleitt fram í upphafi meðferðar [bráð útbreidd graftarútþot].

Tíðni ekki þekkt, einkenni eru m.a.:

- rauðleitir, skotskífulaga eða hringlaga flekkir, sem ekki eru upphleyptir, á búknum, oft með blöðrumyndun í miðjunni, húðflögnun, sárum í munni, hálsi, nefi, kynfærum og augum. Undanfari þessara alvarlegu húðútbrot getur verið hiti og flensulík einkenni [Stevens-Johnson heilkenni/húðþekjudrepslos].

Eftirfarandi aukaverkanir geta einnig komið fram með þessu lyfi:

Mjög algengar (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 einstaklingum):

- höfuðverkur

Algengar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum)

- ógleði
- sundl
- uppköst
- niðurgangur
- viðbrögð í húð eftir sólarljós (*ljósnæmi*).
- útbrot
- kláði

Sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum)

- rugl
- ofskynjanir
- mikil syfja
- skjálftar
- æsingur

Þessar aukaverkanir á taugakerfi koma yfirleitt fram hjá fólki með nýrnavandamál, öldruðum eða líffæraþegum sem taka stóra skammta sem eru 8 grömm eða meira af Valtrex á dag. Þær lagast yfirleitt þegar töku Valtrex er hætt eða skammturinn minnkaður.

Aðrar sjaldgæfar aukaverkanir:

- mæði
- óþægindi í maga
- útbrot, stundum ásamt kláða, ofsakláði
- verkir neðarlega í baki (nýrnaverkir)
- blóð í þvagi

Sjaldgæfar aukaverkanir sem geta komið fram í blóðprófum:

- fækkun hvítra blóðkorna (*hvítkornafæð*)
- fækkun *blóðflagna*, sem eru frumur sem aðstoða við blóðstorknun (*blóðflagnafæð*)
- aukning efna sem framleidd eru í lifur.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum)

- óstöðugleiki við göngu og skortur á samhæfingu (*hreyfiglöp*)
- hæg, þvoglukennd framsögn (*tormæli*)
- flog (krampar)
- breytingar á heilastarfsemi (*heilakvilli*)
- meðvitundarleysi (*dá*)
- ruglaðar eða truflaðar hugsanir (*óráð*)

Þessar aukaverkanir á taugakerfi koma yfirleitt fram hjá fólki með nýrnavandamál, öldruðum eða líffæraþegum sem taka stóra skammta sem eru 8 grömm eða meira af Valtrex á dag. Þær lagast yfirleitt þegar töku Valtrex er hætt eða skammturinn minnkaður.

Aðrar mjög sjaldgæfar aukaverkanir:

- nýrnavandamál þar sem þvaglát eru lítil eða engin.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

- Bólga í nýrum (*millivefsbólga í nýrnapiplum*).

Tilkynning aukaverkana

Látið læknum, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Valtrex

- Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.
- Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetningin er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.
- Geymið við lægri hita en 30°C.
- Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Valtrex inniheldur

- Virka efnið er valacíklóvír. Hver tafla inniheldur 250 mg eða 500 mg af valacíklóvíri (sem valacíklóvírhýdróklóríð).

Önnur innihaldsefni eru:

Töflukjarni

Örkristallaður sellulósi

Krospóvídón

Póvídón

Magnesíumsterat

Vatnsfrí kísilkvoða

Filmuhúð

Hýprómellósi

Títantvíoxíð

Makrógól 400

Pólýsorbit 80 (eingöngu 500 mg töflur)

Carnaubavax

Lýsing á útliti Valtrex og pakkingastærðir

Valtrex töflur eru í pólývínýlklóríð/ál-þynnum.

Valtrex 250 mg töflur fást í öskjum sem innihalda 60 filmuhúðaðar töflur. Þær eru hvítar og merktar „GX CE7“ á annarri hliðinni.

Valtrex 500 mg töflur fást í öskjum sem innihalda 10, 30, 42 eða 112 filmuhúðaðar töflur. Þær eru hvítar og merktar „GX CF1“ á annarri hliðinni.

Ekki er víst að allar pakkingastærðir séu markaðssettar

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi:

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Delta Park 37

2665 Vallensbæk Strand

Danmörk

Framleiðandi:

Glaxo Wellcome S.A.

Aranda de Duero (Burgos)

Spánn

Umboð á Íslandi:

Vistor ehf., sími: 535-7000

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í október 2026.