

Gangið úr skugga um að notað sé rétt lyfjaform og styrkleiki af MabThera®

TIL INNDÆLINGAR UNDIR HÚÐ

TIL INNRENNSLIS Í BLÁÆÐ

MabThera 1400 mg
EINGÖNGU TIL NOTKUNAR VIÐ EITILFRUMUKRABBAMEINI SEM
EKKI ER AF HODGKINS GERÐ



Bleikur plastflipi



Lyfið er dregið upp úr hettuglasinu og gefið með inndælingu undir húð

MabThera 100 mg innrennslisþykkni, lausn
MabThera 500 mg innrennslisþykkni, lausn
Til notkunar við öllum samþykktum ábendingum fyrir MabThera*



Þynnið með 0,9% NaCl eða 5% glúkósa og gefið með innrennsli í bláæð



Aðgætið sértækar merkingar á umbúðum MabThera stungulyfs til notkunar undir húð fyrir notkun:
 Rauð áletrun: **'Aðeins til notkunar undir húð'**, **'lausn til notkunar undir húð'** og **'Undir húð'**

Gefið út af
 F. Hoffmann-La Roche Ltd
 4070 Basel, Sviss


© 2016

Öll nefnd vörumerki eru skráð
www.roche.com

Útgáfa 2.0
 Útbúið í nóvember 2017

Notið lausa hluta merkimiðans til að tryggja að sjúklingnum sé gefið rétt lyfjaform og réttur styrkleiki, eins og sýnt er hér fyrir neðan

**MabThera 1400 mg stungulyf, lausn, til notkunar undir húð
EINGÖNGU TIL NOTKUNAR VIÐ EITILFRUMUKRABBAMEINI SEM EKKI ER
AF HODGKINS GERÐ**



1. Hægt er að fjarlægja lausan hluta merkimiðans á hettuglasinu með MabThera 1.400 mg

2. Fjarlægið lausa hluta merkimiðans

3. Límið lausa hluta merkimiðans á sprautuna