

## Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

### Betadine 100 mg/ml húðvökvi (áburður til penslunar)

povidon-joð

#### **Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.**

Notið lyfið alltaf eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknir eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.
- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

#### **Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:**

1. Upplýsingar um Betadine og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Betadine
3. Hvernig nota á Betadine
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Betadine
6. Pakningar og aðrar upplýsingar

#### **1. Upplýsingar um Betadine og við hverju það er notað**

Betadine er áburður til penslunar sem inniheldur virka efnið povidon-joð sem er mjög virkt örverudrepandi efni. Það verkar gegn sýkingum af völdum baktería, gersveppa, sveppa og veira.

Betadine er sýkladrepandi lyf og er notað til meðferðar og fyrirbyggjandi gegn sýkingum.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

#### **2. Áður en byrjað er að nota Betadine**

##### **Ekki má nota Betadine**

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir povidon-joði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6)
- handa einstaklingum með skjaldkirtilskvilla
- fyrir gjöf geislavirks joðs, meðan á henni stendur og eftir hana
- samhliða notkun lyfja sem innihalda kvikasilfur
- handa börnum undir 1 árs aldri.

##### **Varnaðarorð og varúðarreglur**

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Betadine er notað.

- ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi og lyfið er notað reglulega á rofna húð
- ef þú ert kona og ert þunguð eða með barn á brjósti (sjá kaflann, Meðganga og brjósttagjöf)
- ef þú færð meðferð með litíum
- lausnin er mjög eldfim
- Notkun lyfsins getur valdið tímabundinni mislitun húðar þar sem lyfið er borið á, vegna litar lyfsins.

Betadine er eingöngu til staðbundinnar notkunar.

Stöðva skal meðferð ef vart verður við staðbundin óþægindi eða ofnæmisviðbrögð.

### **Notkun annarra lyfja samhliða Betadine**

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Notkun povidon-joðlyfs samhliða próteinum og öðrum ómettuðum lífrænum efnasamböndum (t.d. greftri, blóði og fitu) getur leitt til þess að verkun minnkar.

Samhliða notkun sárameðferðarlyfja sem innihalda ensímpætti veldur því að það dregur úr áhrifum beggja efna. Efni sem innihalda kvikasilfur, silfur, vetrinsperoxíð og taurolidín geta milliverkað við povidon-joð þannig að efnin dragi úr áhrifum hvors annars.

Povidon-joðlyf geta valdið tímabundnum, dökkum blettum á meðferðarsvæðum þegar þau eru notuð fyrir eða eftir notkun oktenidíns.

Vegna oxunaráhrifa povidon-joðlausnarinnar geta ýmis greiningarlyf sýnt falskar jákvæðar rannsóknarniðurstöður (t.d. próf með toluidíni eða gúmmí guajaki til ákvörðunar á blóðrauða eða glúkósa í hægðum eða þvagi).

Frásog joðs frá povidon-joði getur haft áhrif á próf á starfsemi skjaldkirtils.

### **Meðganga og brjósttagjöf**

Við meðgöngu, brjósttagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Povidon-joð berst í fylgju og er skilið út í brjóstamjólk. Forðast á notkun povidon-joðs nema hugsanlegur ávinningur fyrir móðurina réttlæti hugsanlega áhættu fyrir fóstur og nýbura eða ef ekkert öruggara meðferðarúrræði er tiltækt.

### **Akstur og notkun véla**

Betadine hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

### **Betadine inniheldur etanol**

Lyfið inniheldur 256,6 mg af alkóholi (etanolí) í hverjum millilítra.

Það getur valdið sviða sé það borið á skaddaða húð. Lausnin verður að þorna alveg áður en hægt er að nota raftæki (einkum hátíðni skurðtæki).

## **3. Hvernig nota á Betadine**

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Berið áburðinn óþynntan á sýkt svæði og látið þorna. Notið tvisvar á dag og hyljið með umbúðum ef þörf er á. Hreinsið burstann vel eftir notkun.

### **Notkun handa börnum**

Ekki má nota lyfið hjá börnum undir 1 árs aldri.

## **Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er notaður**

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafið umbúðir lyfsins við höndina.

Við of stóran skammt geta komið fram einkenni frá meltingarvegi, skerðingar á nýrnastarfsemi (þ.m.t. þvagleysi), hraðsláttur, lágþrýstingur, blóðrásarbilun, lungnabjúgu, flog, hiti og efnaskiptablóðsýringur. Einnig getur komið fram truflun á starfsemi skjaldkirtils.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

## **4. Hugsanlegar aukaverkanir**

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarleg ofnæmisviðbrögð (bráðaofnæmi) hafa örsjaldan komið fyrir. Láttu lækninn vita tafarlaust ef vart verður við skyndileg hvæsandi öndunarhljóð, öndunarerfiðleika, þrota í augnlokum, andliti eða vörum, útbrot eða kláða, einkum ef það er um allan líkamann.

### **Mjög sjaldgæfar** (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 notendum)

- Ofnæmi
- Húðkvillar svo sem kláði, útbrot, roði eða þrota í húð (snertihúðbólga)

### **Koma örsjaldan fyrir** (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10.000 notendum)

- Ofvirkur skjaldkirtill sem getur valdið aukinni matarlyst, þyngdartapi eða svitamyndun (einkum hjá sjúklingum með sögu um skjaldkirtilskvilla og langvarandi notkun)
- Ofnæmisbjúgur

### **Tíðni ekki þekkt** (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

- Vanvirkur skjaldkirtill sem getur valdið þreytu og þyngdaraukningu (einkum eftir langvarandi eða mikla notkun)
- Röskun á jafnvægi blóðsalta, of súrt blóð, óeðlileg osmólþéttini blóðs og bráð nýrnabilun (einkum við mikla upptöku lyfsins, t.d. við meðferð brunasára)
- Húðkvillar svo sem mikil hreistrun eða flögnum húðar og húðþurrkur eða hitabruni (vegna alkóhólinnihalds lyfsins)
- Mislitun húðar

## **Tilkynning aukaverkana**

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, [www.lyfjastofnun.is](http://www.lyfjastofnun.is). Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

## **5. Hvernig geyma á Betadine**

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Geymið ekki við hærri hita en 25°C. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

## **6. Pakkningar og aðrar upplýsingar**

### **Betadine inniheldur**

- Virka innihaldsefnið er povidon-joð.
- Önnur innihaldsefni eru: Glýseról, nónoxýnól 9, tvínatríumfosfat (vatnsfrítt), sítrónsýra (einvatnað), natríum hýdroxíð, etanol og hreinsað vatn

### **Lýsing á útliti Betadine og pakkningastærðir**

Rauðbrún tær lausn.

#### *Pakkningastærð:*

Glerglas með pensli, inniheldur 8 ml af lyfinu.

### **Markaðsleyfishafi**

Taw Pharma (Ireland) Limited

104 Lower Baggot Street

Dublin 2

Írland

### **Framleiðandi**

Mundipharma Pharmaceuticals Ltd

13 Othello Street

Dhali Industrial Zone

2540-Nicosia

Kýpur

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Icepharma hf

Lynghálsi 13

110 Reykjavík

Sími 540 8000

**Pessi fylgiseðill var síðast uppfærður í nóvember 2024.**