

## SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

### 1. HEITI LYFS

Locoid 1 mg/g smyrslí.

### 2. INNIHALDSLÝSING

1 g af smyrslí inniheldur 1 mg af hýdrókortisonbútýrati.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

### 3. LYFJAFORM

Smyrslí.

### 4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

#### 4.1 Ábendingar

Locoid er ætlað til meðferðar við húðbólgu, eins og snertiexemi sem og við sóra (psoriasis).

Locoid er ætlað fullorðnum, börnum og ungbörnum eldri en 3 mánaða.

#### 4.2 Skammtar og lyfjagjöf

##### Skammtar

##### *Börn og fullorðnir*

Berist á í jöfnu og þunnu lagi á viðkomandi svæði 1-2 sinnum á dag.

##### *Börn*

Hjá börnum (2-11 ára) og ungbörnum (3-23 mánaða) skal forðast að nota mikið magn, notkun undir lokuðum umbúðum sem og langtímameðferð. Meðferð á að takmarka við minnsta mögulega svæði sem er nauðsynlegt til þess að ná læknanlegum áhrifum.

Hjá ungbörnum (3-23 mánaða) á meðferð auk þess ekki að vara lengur en í 7 daga.

##### *Aldraðir*

Engin sérstök fyrirmæli og ekki þarf að aðlaga skammt hjá öldruðum.

#### 4.3 Frábendingar

Locoid má ekki nota:

- við sýkingu er á yfirborði húðar af völdum baktería, veira, sveppa, gersveppa eða sníkjudýra.
- við rósroða
- við húðbólgu í kringum munn
- ef ofnæmi er fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

#### 4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Locoid á ekki að bera á augnlok og svæði í kringum augu vegna hættu á hægfara gláku (glaucoma simplex) eða undirhýðisdrera (subcapsular cataract).

Forðast á langvarandi meðferð í andliti, á stórum húðsvæðum, í húðfellingum og á öðrum svæðum þar sem húð er þunn, vegna hættu á húðrýrnun og auknu frásogi.

Hendur á að þvo eftir hverja notkun, nema ef verið er að nota Locoid til meðferðar á höndum.

Aukin hætta er á altækum og staðbundnum aukaverkunum við meðferð í húðfellingum, á stórum húðsvæðum, undir lokuðum umbúðum sem og við tíða eða langvarandi notkun. Veita skal athygli hættu á altækum aukaverkunum þ.m.t. bælingu nýrnahettubarkar. Þetta getur komið fljótt fram hjá börnum og getur hamlað útskilnaði á vaxtarhormónum.

Almennt ætti meðferðin ekki að vara lengur en í 4-6 vikur, nema sjúklingurinn sé undir stöðugu eftirliti læknis. Lágmarka skal meðferð undir lokuðum umbúðum (þar sem meðhöndlað svæði er hulið t.d. með bleyju með bakhlið úr plasti).

Þegar meðferð er hætt skyndilega eftir langvarandi notkun, geta einkennin blossað upp að nýju/fyrri einkennum versnað, svokölluð afturkastseinkenni.

Barksterar geta dulið, virkjað og leitt til versunar húðsýkingar. Ef sýkingin versnar þrátt fyrir meðferð með Locoid á að hætta meðferð.

#### Sjóntruflanir

Verið getur að skýrt sé frá sjóntruflunum við altæka og staðbundna notkun barkstera. Ef sjúklingur fær einkenni á borð við þokusýn eða aðrar sjóntruflanir skal íhuga að vísa honum til augnlæknis til að meta mögulegar ástæður, þ.m.t. drer, gláka eða sjaldgæfir sjúkdómar á borð við miðlægan vessandi æðu- og sjónukvilla sem tilkynnt hefur verið um eftir altæka og staðbundna notkun barkstera.

#### Börn

Klínískar rannsóknir hafa sýnt fram á að nota megi Locoid til meðferðar hjá börnum. Börn geta verið næmari en fullorðnir fyrir bælingu nýrnahettubarkar vegna stærra líkamsyfirborðs miðað við líkamsþyngd. Nota skal Locoid með varúð og eins og heilbrigðisstarfsmenn hafa ráðlagt.

Gæta á sérstakrar varúðar hjá ungbörnum með húðbólgu þ.m.t. bleyjuútbrot (sjá kafla 4.2).

### **4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir**

Engar þekktar.

### **4.6 Meðganga og brjóstgjöf**

#### Meðganga

Engar eða takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun hýdrókortisonbútýrats á meðgöngu.

Fyrirliggjandi upplýsingar úr dýrarannsknum nægja ekki til að segja fyrir um eituverkanir hýdrókortisonbútýrats á æxlun. Dýrarannskni hafa sýnt að flokkur öflugri barkstera hafa vanskapandi áhrif eftir notkun á húð.

Altæk útsetning vegna frásogs staðbundins hýdrókortisonbútýrats er óveruleg. Locoid má aðeins nota á meðgöngu ef hugsanlegur ávinningur vegur þyngra en hugsanleg áhætta.

#### Brjóstgjöf

Notkun Locoid við brjóstgjöf er ekki talin hafa áhrif á brjóstmylkinga því altækt frásog staðbundins hýdrókortisonbútýrats er óverulegt.

Locoid má nota meðan á brjóstgjöf stendur en mælt er með því að forðast beina notkun Locoid á brjóstið.

## Frjósemi

Engar upplýsingar úr dýrarannsóknnum eða klínískum rannsóknum liggja fyrir um Locoid og frjósemi. Altækt frásog eftir staðbundna notkun Locoid er óveruleg og því er ekki búist við því að notkun Locoid hafi áhrif á frjósemi hjá mönnum.

## 4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Locoid hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

## 4.8 Aukaverkanir

Greint hefur verið frá ertingu í húð og ofnæmi í klínískum rannsóknum.

Algengustu aukaverkanirnar sem tilkynntar hafa verið eftir markaðssetningu eru ofnæmi og húðviðbrögð eins og roði, kláði og sýkingar í húð.

Aukaverkanir eru flokkaðar eftir MedDRA líffæraflokkum.

Tíðnin er skilgreind þannig: Koma örsjaldan fyrir (<1/10.000), mjög sjaldgæfar (≥1/10.000 til <1/1.000), sjaldgæfar (≥1/1.000 til <1/100), algengar (≥1/100 til <1/10), mjög algengar (≥1/10) og tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirbyggjandi gögnum). Innan tíðniflokka eru alvarlegustu aukaverkanirnar taldar upp fyrst.

Líffæraflokkur	Mjög sjaldgæfar	Koma örsjaldan fyrir	Tíðni ekki þekkt
Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra			Sýkingar í húð
Innkirtlar		Bæling nýrnahettubarkar	
Augu			Þokusýn*
Húð og undirhúð	Húðrýrnun ** Háræðavíkkun Purpuri Húðslit Hörundsroði Þrymlabólur Húðbólga í kringum munn Húðbólga Ofnæmishúðbólga Litabreytingar í húð Skeggvöxtur Aukinn hárvöxtur Útbrot Afleidd sýking		Kláði
Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað	Afturkastseinkenni	Ofnæmi	Verkur á notkunarstað

\*Sjá kafla 4.4.

\*\* Oft óafturkræft með þynningu yfirhúðar.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu til Lyfjastofnunar, [www.lyfjastofnun.is](http://www.lyfjastofnun.is).

## 4.9 Ofskömmun

Engar upplýsingar liggja fyrir um ofskömmun. Mikil notkun undir lokuðum umbúðum getur valdið bælingu nýrnahettubarkar.

Meðferð: Eftir einkennum.

## 5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

### 5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Barksterar, húðlyf, einir sér, með meðalsterka verkun (flokkur II), ATC flokkur: D 07 AB 02.

Locoid hefur bólgueyðandi og æðapregjandi verkun og hemur bólguviðbrögð.

### 5.2 Lyfjahvörf

#### Frásog

Hýdrókortisonbútyrat fer inn í húðina og situr eftir sem forði í efsta lagi húðarinnar, aðallega í hornlaginu. Hraði og hversu djúpt lyfið fer í húðina eykst með notkun lokaðra umbúða, við bólgusjúkdóma í húð (t.d. sóri, exem) og með ákveðnum burðarefnum. Altæk áhrif koma ekki fram við ráðlagða skammta.

#### Dreifing

Við altækt frásog er hýdrókortisonbútyrat og hýdrókortison mikið próteinbundið í plasma (allt að 95% af hýdrókortisoni), aðallega við albúmín og í minna mæli við transcortín (barksterabindandi prótein í plasma).

#### Umbrot

Ekki er búist við marktækri umbreytingu í yfirhúð. Þegar hýdrókortisonbútyrat hefur frásogast í gegnum húð umbrotnar það aðallega í lifur, í hýdrókortison og önnur umbrotsefni. Hýdrókortison er náttúrulegur barksteri í líkamanum sem umbrotnar einnig í lifur í óvirk umbrotsefni.

#### Brotthvarf

Umbrotsefnin og lítið magn af hýdrókortisonbútyrati sem ekki hefur brotnað niður skilst út í gall með þvagi og síðan með hægðum.

Hjá heilbrigðum sjálfboðaliðum leiddi notkun 0,1% barksterakrems, undir lokuðum umbúðum með plasti, til útskilnaðar 9,5% af notuðum skammti með þvagi og sama magns með hægðum eftir 16 klst.

### 5.3 Forklínískar upplýsingar

Hýdrókortison-17-bútyrat, er barksteri með meðalsterka verkun og hefur meiri verkun en hýdrókortison og breiðari öryggismörk en sterar sem innihalda flúor.

## 6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

### 6.1 Hjálparefni

Pólýetýlen

Þunnfljótandi paraffínolía.

## **6.2 Ósamrýmanleiki**

Á ekki við.

## **6.3 Geymsluþol**

5 ár.

Eftir að túpan er fyrst opnuð: 6 mánuðir.

## **6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu**

Geymið við lægri hita en 25°C.

## **6.5 Gerð íláts og innihald**

Túpur.

Pakkingastærðir: 30 g og 100 g.

Ekki er víst að allar pakkingastærðir séu markaðssettar.

## **6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun**

Engin sérstök fyrirmæli.

## **7. MARKAÐSLEYFISHAFI**

CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH

Ziegelhof 24

17489 Greifswald

Þýskalandi

## **8. MARKAÐSLEYFISNÚMER**

MTnr 761992 (IS)

## **9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS**

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 1. desember 1997.

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 28. september 2009.

## **10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS**

1. apríl 2021.