

FYLGISEÐILL:

Finquel vet. 1000 mg/g duft fyrir baðlausn, svæfingarlyf fyrir atlantshafslax, regnbogasilung og á tilraunastigi gagnvart þorski.

1. HEITI OG HEIMILISFANG MARKAÐSLEYFISHAFA OG ÞESS FRAMLEIÐANDA SEM BER ÁBYRGÐ Á LOKASAMÞYKKT, EF ANNAR

Markaðsleyfishafi:

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN Boxmeer
Holland

Framleiðandi sem ber ábyrgð á lokasamþykkt:

Curida AS
Solbærvegen
2409 Elverum
Noregur

2. HEITI DÝRALYFS

Finquel vet. 1000 mg/g duft fyrir baðlausn, svæfingarlyf fyrir atlantshafslax, regnbogasilung og á tilraunastigi gagnvart þorski.

3. VIRK(T) INNIHALDSEFNI OG ÖNNUR INNIHALDSEFNI

Tricainmesilat 1000 mg/g.

4. ÁBENDING(AR)

Til slævingar og deyfingar á atlantshafslaxi, regnbogasilungi og á tilraunastigi gagnvart þorski til að tryggja tímabundna deyfingu/hreyfingarleysi við bólusetningu, flokkun, vigtun, kreistingu klakfiska o.s.frv.

5. FRÁBENDINGAR

Engar.

6. AUKAVERKANIR

Engar þekktar.

Gerid dýralækni viðvart ef vart verður einhverra aukaverkana, jafnvel aukaverkana sem ekki eru tilgreindar í fylgiseðlinum eða ef svo virðist sem lyfið hafi ekki tilætluð áhrif.

7. DÝRATEGUND(IR)

Atlantshafslax, regnbogasilungur og á tilraunastigi gagnvart þorski.

8. SKAMMTAR FYRIR HVERJA DÝRATEGUND, ÍKOMULEIÐ(IR) OG AÐFERÐ VIÐ LYFJAGJÖF

Skammtur fyrir lax og regnbogasilung:

Stig svæfingar	Skammtur mg/l	Hámarkstími í svæfingarlausn	Vöknunartími eftir flutning í hreint vatn
Slæving	15-30	6 klst.	-
Svæfing	50-60	30 mín.	2-20 klst.
Hröð svæfing	80-135	4-12 mín.	3-19 mín.

Skammtur fyrir þorsk:

Stig svæfingar	Skammtur mg/l	Hámarkstími í svæfingarlausn	Vöknunartími eftir flutning í hreint vatn
Svæfing	50	5 mín.	U.þ.b. 4 mín.

Fyrir þorsk: Við takmörkuð lyfjaáhrif er í lagi að auka lyfjaskammtinn í 60 mg/l.

Úr Finquel vet. er útbúin vatnslausn í þeim styrkleika sem við a og fiskurinn hafður í henni þar til ætluðu svæfingarstigi er náð.

9. LEIÐBEININGAR UM RÉTTA LYFJAGJÖF

Við notkun dýralyfsins í ferskvatni fæst betri verkun með því að tryggja sem næst hlutlaust sýrustig í lyfjalausninni með hjálp natríumbíkarbónats í jöfnu hlutfalli við dýralyfið.

Þegar útbúin er stofnlausn fyrir Finquel vet. skal vega tilskilið magn duftsins og það sett út í vatn. Stofnlausn fyrir natríumbíkarbónat er útbúin á sama hátt. Þessar stofnlausnir skal alltaf útbúa og geyma aðskildar. Síðan er jöfnu magni af Finquel vet. og bíkarbónatinu blandað í svæfingarkerið. Blandan er tær. Við notkun dýralyfsins í söltu vatni er ekki þörf á sérstakri hlutleysingu sýrustigs eins og lýst er hér að ofan. Stofnlausn skal eingöngu nota sama dag og hún er útbúin. Útþynnta lyfjalausn skal endurnýja nokkrum sinnum á dag.

Útþynnta lyfjablönduna skal súrefnisbæta (>7 mg/l).

Skammtar eru hitastigsháðir. Þegar æskilegum lyfjaáhrifum er náð ber að flytja fiskinn yfir í hreint(lyfjalaust) vatn.

Í upphafi vinnu með svæfingalyfið er ráðlagt að prófa útþynnta lyfjablönduna með nokkrum fiskum þess hóps sem ætlunin er að vinna með.

Öryggi við notkun lyfsins við hitastig <7°C og >17°C er ekki staðfest.

10. BIÐTÍMI FYRIR AFURÐANÝTINGU

Afurðir: 25 gráðudagar. Ef þorski er slátrað innan 21 sólarhrings skal lifrinni fargað.

11. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VIÐ GEYMSLU

Geymið í upprunalegum umbúðum.

Geymið plastfötuna vel lokaða til varnar gegn ljósi og raka.

Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Notið ekki eftir fyrningardagsetningu á plastfötunni.

12. SÉRSTÖK VARNADARORÐ

Lyfið er ertandi komist það í snertingu við augu, öndunarfæri og óvarða húð. Ef sá sem annast lyfjagjöf tekur dýralyfið inn fyrir slysi, skal tafarlaust leita til læknis og hafa meðferðis fylgiseðil eða umbúðir dýralyfsins. Komist lyfið í snertingu við augu skal skola með vatni og hafa samband við lækni. Nota skal hlífðarfatnað t.d. hanska og rykgrímu þegar óblandað dýralyfið er handleikið. Nota skal hanska þegar blandað dýralyfið er handleikið og forðast að lyfið berist í augu og munn.

Í einstaka tilfellum geta þeir sem eru með ofnæmi og/eða þeir sem í starfi eru mikið útsettir fyrir lyfinu þróað með sér metrauðablæði (methaemoglobinaemia) eftir snertingu við dýralyfið.

Við ofskömmtun skal flytja fiskana yfir í hreint rennandi vatn og tálkn þeirra skuluð þar til eðlilegri öndun er náð.

Ef lyfið kemst óþynnt í vatn verður að tryggja fullnægjandi þynningu í vatninu.

13. SÉRSTAKAR VARÚÐARREGLUR VEGNA FÖRGUNAR ÓNOTADRA LYFJA EÐA ÚRGANGS, EF VIÐ Á

Leitið ráða hjá dýralækni um hvernig heppilegast er að losna við lyf sem ekki þarf að nota lengur. Þetta er gert til þess að vernda umhverfið.

14. DAGSETNING SÍÐUSTU SAMÞYKKTAR FYLGISEÐILSINS

10.12.2019.

Upplýsingar á íslensku eru á <http://www.serlyfjaskra.is>.

15. AÐRAR UPPLÝSINGAR

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.
Pakkningastærðir: 100 g, 1000 g.

Ef óskað er upplýsinga um þetta dýralyf, vinsamlegast hafið samband við markaðsleyfishafa.