

## Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

**Fungyn 50 mg hart hylki**  
**Fungyn 150 mg hart hylki**  
**Fungyn 200 mg hart hylki**  
flúkónazól

### Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um lyfið.
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
- Látið lækinn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

### Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Fungyn og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Fungyn
3. Hvernig nota á Fungyn
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Fungyn
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

## 1. Upplýsingar um Fungyn og við hverju það er notað

Fungyn tilheyrir flokki lyfja sem kallast sveppalyf. Virka efnið er flúkónazól.

Fungyn er notað til meðhöndlunar sýkinga af völdum sveppa og getur einnig verið notað til að fyrirbyggja candidasýkingar. Algengasta orsök sveppasýkinga er sveppur sem kallast *Candida*.

Þú gætir fengið þetta lyf frá læknum til meðhöndlunar eftirtalinna sýkinga:

- Mengisbólga af völdum *cryptococca* - sveppasýking í heila.
- Þekjumygla - sýking í lungnaberkjum.
- Sýkingar af völdum *Candida* sem koma fram í blóði, líffærum (t.d. hjarta, lungum) eða þvagrás.
- Þruskusýking í slímhúð - sýking í munni, koki eða særindi undan gervitönnum.
- Þruskusýking á kynfærum - sýking í leggöngum eða getnaðarlim.
- Húðsýkingar - t.d. fótisveppir, reformur, klofsveppir, naglasýking.

Þú gætir einnig fengið Fungyn til að:

- Fyrirbyggja endurtekna mengisbólgu af völdum *cryptococca*.
- Fyrirbyggja endurtekna þruskusýkingu í slímhúð.
- Draga úr endurteknum þruskusýkingum í leggöngum.
- Fyrirbyggja *Candida* sýkingar (ef þú ert með bælt ónæmiskerfi).

### Börn og unglíngar (0 til 17 ára)

Þú gætir fengið þetta lyf frá læknum við eftirtöldum sveppasýkingum:

- Þruskusýking í slímhúð - sýking í munni eða hálsi.
- Sýkingar af völdum *Candida* sem koma fram í blóði, líffærum (t.d. hjarta, lungum) eða þvagrás.
- Mengisbólga af völdum *cryptococca* - sveppasýking í heila.

Þú gætir einnig fengið Fungyn til að:

- Fyrirbyggja Candida sýkingar (ef þú ert með bælt ónæmiskerfi).
- Fyrirbyggja endurtekna mengisbólgu af völdum cryptococca.

## 2. Áður en byrjað er að nota Fungyn

Verið getur að lækningin hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

### Ekki má nota Fungyn ef þú

- ert með ofnæmi fyrir flúkónazóli, öðrum lyfjum sem þú hefur tekið við sveppasýkingu eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6). Einkennin gætu verið kláði, roði í húð eða öndunarerfiðleikar
- tekur lyfin astemizol, terfenadin (andhistamín lyf við ofnæmi)
- tekur lyfið císapríð (notað við sjúkdómum í meltingarvegi)
- tekur lyfið pimozíð (lyf við geðrofi)
- tekur lyfið quinidín (lyf við hjartsláttartruflunum)
- tekur lyfið erýtrómýsín (sýklalyf við sýkingum)

### Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækningunni eða lyfjafræðingi áður en Fungyn er notað ef þú

- ert með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
- ert með hjartasjúkdóm, þar með talda hjartsláttartruflanir
- ert með óeðlilegt magn kalíum, kalsíum eða magnesíum í blóði
- færð alvarleg einkenni frá húð (kláða, roða í húð) eða færð öndunarerfiðleika
- færð einkenni nýrnahettubíunna þar sem nýrnahettur myndu ekki nægilegt magn ákveðinna steroíðhormóna, svo sem hýdrókortisón (viðvarandi eða langvarandi þreyta, vöðvaslappleiki, lystarleysi, þyngdartap og kviðverkir).
- hefur einhvern tíma fengið alvarleg húðútbrot eða húðflögnun, blöðrun og/eða sár í munni eftir töku Fungyn.

Tilkynnt hefur verið um alvarleg húðviðbrögð þar með talin lyfjaviðbrögð með fjölgun rauðkyrninga og altækum einkennum (DRESS) í tengslum við meðferð með Fungyn. Þú skalt hætta töku Fungyn tafarlaust og leita læknisaðstoðar ef þú tekur eftir einhverjum þeim einkennum sem tengjast þessum alvarlegu húðviðbrögðum og lýst er í kafla 4.

- ef sveppasýkingin batnar ekki, vegna þess að nauðsynlegt getur verið að nota önnur sveppalyf.

### Notkun annarra lyfja samhliða Fungyn

Látið lækningunni eða lyfjafræðingi vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Látið lækningunni **strax** vita ef þú tekur astemizol, terfenadin (andhistamín notað við ofnæmi) eða císapríð (notað við sjúkdómum í meltingarvegi) eða pimozíð (lyf við geðrofi) eða kínidín (notað við hjartsláttartruflunum) eða erýtrómýsín (sýklalyf við sýkingum) þar sem ekki má taka þessi lyf samtímis Fungyn (sjá kafla "Ekki má nota Fungyn ef þú").

Sum lyf geta haft milliverkanir við Fungyn. Vertu viss um að lækningin viti ef þú tekur eftirtalin lyf:

- rifampicin eða rifabutín (sýklalyf við sýkingum)
- alfentanil, fentanyl (svæfingarlyf)
- amitríptýlin, nortríptýlin (þunglyndislyf)
- amfóterísín B, voriconazol (sveppalyf)
- blóðþynnningarlyf sem fyrirbyggja blóðtappa (warfarín eða svipuð lyf)
- benzodíazepín (midazolam, triazolam eða svipuð lyf) notuð sem svefnlyf eða við kvíða
- karbamazepín, fenýtóín (flogaveikilyf)

- nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin og losartan (við háþrýstingi - háum blóðþrýstingi)
- olaparib (notað við krabbameini í eggjastokkum)
- ciclosporin, everolimus, sirolimus og tacrolimus (notuð til að fyrirbyggja höfnun ígræddra líffæra)
- cyclophosphamid, vinca alkalóíðar (vincristin, vinblastin eða svipuð lyf) notuð við krabbameini
- halofantrin (notað við malaríu)
- statín (atorvastatin, simvastatin, fluvastatin og svipuð lyf) notuð til að lækka kólesteról
- metadón (verkjalyf)
- celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxicam, meloxicam, diclofenac (bólguþandi lyf sem eru ekki sterar)
- getnaðarvarnalyf til inntöku
- prednisón (steri)
- zidovudin, einnig þekkt sem AZT; saquinavir (notað hjá HIV-sýktum sjúklingum)
- lyf við sykursýki, svo sem chlopropamid, glibenclamid, glipizid eða tolbutamid
- theophyllin (notað við astma)
- tofacitinib (notað við liðagigt)
- A vítamín (fæðubótarefni)
- ivacaftor (við slímseigjusjúkdómi)
- amiodaron (lyf við hjartsláttartruflunum)
- hýdróklórótíazíð (þvagræsilyf)

### **Notkun Fungyn með mat og drykk**

Taka má lyfið með mat eða milli mála.

### **Meðganga og brjóstgjöf**

Við meðgöngu, brjóstgjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Ef þú ráðgerir að verða þunguð er mælt með því að bíða í eina viku eftir stakan skammt af flúkónazóli áður en þú verður þunguð.

Í lengri meðferðarlotum með flúkónazóli skaltu ráðfæra þig við lækinn um þörfina á viðeigandi getnaðarvörn meðan á meðferð stendur, sem á að halda áfram í eina viku eftir síðasta skammt.

Þú skalt ekki taka Fungyn ef þú ert þunguð, grunar að þú sért þunguð, ef þungun er fyrirhuguð eða þú ert með barn á brjósti, nema lækinn mæli svo fyrir.

Flúkónazól sem er tekið á fyrsta eða öðrum þriðjungi meðgöngu getur aukið hættuna á fósturláti. Flúkónazól sem er tekið á fyrsta þriðjungi meðgöngu getur aukið hættuna á því að barnið fæðist með fæðingargalla í hjarta, beinum og/eða vöðvum.

Tilkynnt hefur verið um börn sem fæddust með fæðingargalla á höfuðkúpu, eyrum og beinum í læri og olnboga hjá konum sem fengu meðferð í þrjá mánuði eða lengur með stórum skömmtum (400-800 mg á dag) af flúkónazóli við þekjumyglu (coccidiodomycosis). Tengslin milli flúkónazóls og þessara tilvika eru óljós.

Halda má brjóstgjöf áfram eftir inntöku á einum stökum skammti af Fungyn 150 mg.

Við endurtekna skammta af Fungyn má ekki halda brjóstgjöf áfram.

### **Akstur og notkun véla**

Við akstur og notkun véla skal hafa það í huga að svimi og krampar geta komið fyrir.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og

aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

#### **Fungyn inniheldur laktósa**

Þetta lyf inniheldur lítið magn af laktósa (mjólkursykrum). Ef læknirinn hefur sagt þér að þú sért með óþol fyrir sumum sykrum skaltu ráðfæra þig við hann áður en þú tekur þetta lyf.

#### **Fungyn inniheldur natríum (salt)**

Þetta lyf inniheldur minna en 1 mmól af natríum (23 mg) í hverju hörðu hylki, þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust.

#### **Fungyn 150 mg hart hylki inniheldur Sunset yellow (E110)**

Fungyn 150 mg hart hylki inniheldur einnig litarefnið Sunset yellow (E110) sem getur valdið ofnæmisviðbrögðum.

### **3. Hvernig nota á Fungyn**

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig á að nota lyfið leitaðu þá upplýsinga hjá læknum eða lyfjafræðingi.

Gleypið hylkið heilt með glasi af vatni. Best er að taka hylkin alltaf á sama tíma dags.

Ráðlagðir skammtar þessa lyfs við mismunandi sýkingum eru hér fyrir neðan:

#### **Notkun hjá fullorðnum**

<b>Ástand</b>	<b>Skammtur</b>
Við mengisbólgu af völdum <i>cryptococca</i>	400 mg fyrsta daginn, þá 200 mg til 400 mg einu sinni á dag í 6 til 8 vikur eða lengur ef þörf krefur. Skammtar geta verið auknir í 800 mg.
Til að fyrirbyggja endurtekna sýkingu af völdum <i>cryptococca</i>	200 mg einu sinni á dag þangað til þér er sagt að hætta.
Við þekjumyglu	200 mg til 400 mg einu sinni á dag frá 11 mánuðum í allt að 24 mánuði eða lengur ef þörf krefur. Skammtar geta verið auknir í 800 mg.
Við innri sýkingum af völdum <i>Candida</i>	800 mg fyrsta daginn, þá 400 mg á dag þangað til þér er sagt að hætta.
Við slímhúðarsýkingum í munni, hálsi og við særindum undan gervitönnum	200 mg til 400 mg fyrsta daginn, þá 100 mg til 200 mg einu sinni á dag þangað til þér er sagt að hætta
Við þruskusýkingu í slímhúð - skammtar fara eftir staðsetningu sýkingarinnar	50 mg til 400 mg einu sinni á dag í 7 til 30 daga þangað til þér er sagt að hætta
Til að fyrirbyggja endurteknar sveppasýkingar í munni og hálsi	100 mg til 200 mg einu sinni á dag, eða 200 mg 3svar í viku, meðan hætta er á sýkingu
Við þruskusýkingum í kynfærum	150 mg í stökum skammti
Til að fyrirbyggja endurteknar þruskusýkingar í leggögnum	150 mg þriðja hvern dag, alls 3 skammtar (daga 1, 4 og 7) og þá einu sinni í viku í 6 mánuði meðan hætta er á sýkingu
Við sveppasýkingum í húð og nöglum	Eftir staðsetningu sýkingarinnar 50 mg einu sinni á dag, 150 mg einu sinni í viku, 300 mg til 400 mg einu sinni í viku í 1 til 4 vikur (fótsveppasýkingar geta varað í allt að 6 vikur, naglasýkingar þangað til heilbrigð nögl er komin

	í stað þeirrar sýktu)
Til að fyrirbyggja <i>Candida</i> sýkingu (ef þú ert með bælt ónæmiskerfi)	200 mg til 400 mg einu sinni á dag meðan hætta er á sýkingu

### Notkun hjá unglíngum frá 12 til 17 ára

Fylgið leiðbeiningum læknis um skammta (ýmist sömu skammtar og fyrir fullorðna eða börn).

### Notkun hjá börnum frá 4 vikna til 11 ára

Hámarksskammtur fyrir börn er 400 mg á dag.

Skammturinn fer eftir þyngd barnsins í kílógrömmum.

Ástand	Skammtur
Þruskusýking í slímhúð og sýkingar í hálsi af völdum <i>Candida</i> - skammtur og meðferðartími fara eftir alvarleika og staðsetningu sýkingarinnar	3 mg á hvert kg líkamsþyngdar einu sinni á dag (6 mg á hvert kg líkamsþyngdar gæti verið gefið fyrsta daginn)
Mengisbólga af völdum <i>cryptococca</i> eða innri sveppasýkingar af völdum <i>Candida</i>	6 mg til 12 mg á hvert kg líkamsþyngdar einu sinni á dag
Til að fyrirbyggja endurtekna sýkingu af völdum <i>cryptococca</i>	6 mg á hvert kg líkamsþyngdar einu sinni á dag
Til að fyrirbyggja <i>Candida</i> sýkingar í börnum (með bælt ónæmiskerfi)	3 mg til 12 mg á hvert kg líkamsþyngdar einu sinni á dag

### Notkun hjá börnum 0 til 4 vikna

Notkun hjá 3 til 4 vikna gömlum börnum:

- Sömu skammtar og hér að ofan en gefið einu sinni á 2 daga fresti. Hámarksskammtur er 12 mg á hvert kg líkamsþyngdar á hverjum 48 klst.

Notkun hjá börnum yngri en 2 vikna:

- Sömu skammtar og hér að ofan en gefið einu sinni á 3 daga fresti. Hámarksskammtur er 12 mg á hvert kg líkamsþyngdar á hverjum 72 klst.

### Aldraðir

Nota skal ráðlagða fullorðinsskammta nema þú sért með nýrnasjúkdóm.

### Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi

Læknirinn gæti viljað breyta skammtinum til samræmis við nýrnastarfsemi.

### Ef stærri skammtur en mælt er fyrir um er tekinn

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef þú tekur of mörg hörð hylki í einu gætir þú veikst. Hafðu strax samband við lækinn eða bráðamóttöku. Einkenni ofskömmtunar geta meðal annars verið að heyra, sjá, finna eða hugsa um hluti sem eru ekki raunverulegir (ofskynjanir eða ofsóknaræði). Meðferð gegn einkennum (stoðmeðferð og magaskolon ef þörf krefur) getur verið nægileg.

### Ef gleymist að taka Fungyn

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Ef þú gleymir skammti, skaltu taka hann um leið og þú manst eftir því. Ef það er stutt þangað til þú átt að taka næsta skammt skaltu sleppa skammtinum sem gleymdist og halda áfram eins og venjulega.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

## 4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Sumir fá **ofnæmisviðbrögð**, þó alvarleg ofnæmisviðbrögð séu sjaldgæf. Ef þú færð eitthvert eftirtalinna einkenna **skaltu strax hafa samband við lækinn**:

- Skyndileg mæði, öndunarerfiðleikar eða andþrengsli.
- Bólga í augnlokum, andliti eða vörum.
- Kláði í öllum líkamanum, roði í húð eða rauðir kláðablettir.
- Útbrot.
- Alvarleg húðviðbrögð svo sem útbrot sem valda blöðrum (þetta getur komið fram í munni og tungu).

Fungyn getur haft áhrif á lifrina. Einkenni lifrarvandamála eru meðal annars:

- Þreyta.
- Lystarleysi.
- Uppköst.
- Gullituð húð eða augnhvíta (gula).

Ef eitthvert þessara einkenna kemur fram, skaltu hætta að taka Fungyn og **hafa strax samband við lækinn**.

Þú skalt hætta töku Fungyn tafarlaust og leita lækniástoðar ef þú tekur eftir einhverjum af eftirtöldum einkennum:

- Útbreidd útbrot, hár líkamshiti og stækkaðir eitlar (DRESS heilkenni eða heilkenni lyfjaofnæmis).

#### **Aðrar aukaverkanir**

Að auki, ef einhver af eftirtöldum aukaverkunum verða alvarlegar eða ef þú finnur fyrir einhverjum aukaverkunum sem eru ekki taldar í þessum fylgiseðli, skaltu hafa samband við lækinn eða lyfjafraeðing.

**Algengar** aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 einstaklingum) eru:

- Höfuðverkur
- Magaóþægindi, niðurgangur, ógleði, uppköst
- Aukning á lifrarendímum í blóðprufum
- Útbrot

**Sjaldgæfar** aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 einstaklingum) eru:

- Fækkun á rauðum blóðkornum sem getur gert húðina föla og valdið slappleika og mæði
- Lystarleysi
- Andvökur, þreytutilfinning
- Krampar, svimi, sundl, náladofi eða doði, breytingar á bragðskyni
- Hægðatregða, meltingartruflanir, vindgangur, munnþurrkur
- Vöðvaverkir
- Lifrarskemmdir og gulnun húðar eða augna (gula)
- Kláðabólur, blöðrur á húð, kláði, aukin svitamyndun
- Þreyta, almenn óþægindatilfinning, hiti

**Mjög sjaldgæfar** aukaverkanir (geta komið fyrir hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum) eru:

- Fækkun hvítra blóðkorna sem hjálpa að verjast sýkingum og blóðfrumum sem hjálpa að stoppa blæðingu
- Rauður eða fjólublár húðlitur sem getur orsakast af blóðflagnafæð, aðrar blóðbreytingar
- Efnafræðilegar breytingar í blóði (aukning á kólesteróli og fitum í blóði)
- Lækkun á kalíum í blóði

- Skjálfti
- Óeðlilegt hjartalínurit, breytingar á hjartsláttarhraða eða takti
- Lifrabílan
- Ofnæmisviðbrögð (stundum alvarleg), þar með talin útbreiddar blöðrur, útbrot og húðflögnun, alvarleg húðviðbrögð, bólga í vörum eða andliti
- Hárlas

**Tíðni ekki þekkt** (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum) en geta komið fyrir:

- Ofnæmisviðbrögð með útbrotum, hita, þrútnum kirtlum, fjölgun einnar tegundar hvítra blóðkorna (rauðkyrninga) og bólgu í innri líffærum (lifur, lungum, hjarta, nýrum og ristli) (lyfjaviðbrögð með fjölgun rauðkyrninga og altækum einkennum) (DRESS))

### Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint samkvæmt fyrirkomulagi sem gildir í hverju landi fyrir sig, sjá [Appendix V](#). Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

## 5. Hvernig geyma á Fungyn

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á öskjunni og þynnu á eftir „EXP“. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

## 6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

### Fungyn inniheldur

- Virka innihaldsefnið er flúkónazól.  
Hvert Fungyn 50 mg hart hylki inniheldur 50 mg af flúkónazóli.  
Hvert Fungyn 150 mg hart hylki inniheldur 150 mg af flúkónazóli.  
Hvert Fungyn 200 mg hart hylki inniheldur 200 mg af flúkónazóli.
- Önnur innihaldsefni eru:  
*Innihald hylkis:* laktósaeinhýdrat, örkrystallaður sellulósi, forhleypt maíssterkja, kísiltvíoxíð, magnesíumsterat og natríumlárylsúlfat.  
*Hylkisskel:* títantvíoxíð (E171), kínólíngult (E104) (eingöngu 50 mg og 150 mg), gult járnnoxíð (E172) (eingöngu 50 mg), patent blátt V (E131) (eingöngu 50 mg), sunset yellow (E110) (eingöngu 150 mg) og gelatín.

### Útlit Fungyn og pakkningastærðir

Fungyn 50 mg hörð hylki eru græn-hvít á lit, stærð 2.

Fungyn 150 mg hörð hylki eru gul á lit, stærð 0.

Fungyn 200 mg hörð hylki eru hvít á lit, stærð 0.

Fungyn er pakkað í pappakassa sem inniheldur viðeigandi fjölda af gegnsæjum PVC/álþynnum.

### Pakkningastærðir:

Fungyn 50 mg hörð hylki: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50 eða 100 hörð hylki.

Fungyn 150 mg hörð hylki: 1, 2 eða 4 hörð hylki.

Fungyn 200 mg hörð hylki: 7, 10, 14, 20, 28, 50 eða 100 hörð hylki.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

### **Markaðsleyfishafi**

Alvogen ehf.  
Smáratorgi 3  
201 Kópavogur  
Ísland

### **Framleiðandi**

Pharmathen S.A., 6 Dervenakion str, 15344 Pallini, Attiki, Grikkland

### **Þetta lyf hefur markaðsleyfi í löndum Evrópska efnahagssvæðisins undir eftirfarandi heitum:**

Belgía: Fluconazole Viatriis 50/100/150/200 mg harde capsules

Eistland: Fluconazole ELVIM 50/150 mg capsules, hard

Grikkland: Stabilanol 200 mg capsules

Holland: Fluconazol Pharmathen 50/100/150/200 mg capsules

Kýpur: Mycozal 50/100/150/200 mg capsules

Lettland: Fluconazole ELVIM 50/150 mg capsules

Litháen: Fluconazole ELVIM 50/150 mg capsules

Lúxemborg: Fluconazole Viatriis 50/100/150/200 mg gélule

**Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í febrúar 2024.**