

Xyrem[®] (natríumoxybat)

MIKILVÆGAR ÖRYGGISUPPLÝSINGAR FYRIR SJÚKLINGA

- Hafðu þetta öryggiskort alltaf meðferðis.
- Sýndu öryggiskortið þeim læknum og heilbrigðisstarfsmönnum sem þú ferð til.
- Hafðu lista yfir öll lyf sem þú notar meðferðis þegar þú ferð til læknisins eða annars heilbrigðisstarfsmanns.
- Hafðu strax samband við lækinn ef þú finnur fyrir óvenjulegum einkennum svo sem óeðlilegum hugsunum, hugsanir um að skaða aðra þar meðtaldar, meðan á töku Xyrem stendur.
- Hafðu strax samband við lækinn ef þú finnur fyrir einkennum t.d. að pissa undir, missa stjórn á þvaglátum eða hægðum, ringlun, ofskynjun, svefngöngu eða breyttum hugsanagangi.
- Geymið Xyrem þar sem börn hvorki ná til né sjá
- Einkenni ofskömmtunar Xyrem geta verið æsingur, ringlun, skert hreyfigeta, skert öndun, óskýr sjón, mikil svitamyndun, höfuðverkur, uppköst, skert meðvitund sem leiðir til dás og floga.
- Ef þú tekur meira af Xyrem en þér var sagt að taka, eða tekur það inn fyrir mistök, skaltu tafarlaust leita á bráðamóttöku.
- Þú skalt taka merkt lyfjaglassið með þér, jafnvel þó það sé tomt.



Þessar upplýsingar eru hluti af áættun til að auka öryggi við notkun lyfsins sem krafist er af lyfjafirvöldum.

Upplýsingar um tengiliði

Dags. fyrstu ávísunar Xyrem

Nafn sjúklings

Símanúmer sjúklings

Nánasti aðstandandi

Símanúmer nánasta aðstandanda

Læknirinn sem sér um meðferðina

Símanúmer læknisins

Neyðarnúmer

Mikilvægar öryggisupplýsingar fyrir sjúklinga

Xyrem getur bælt öndun og meðvitund.

- **EKKI** neyta áfengis meðan á meðferð með Xyrem stendur.
- **EKKI** taka stærri skammt en lækningin hefur ávísað.
- **EKKI** aka eða nota vélar innan 6 klst. frá töku Xyrem.
- **EKKI** nota önnur lyf án þess að ræða það við lækninginn.
- **EKKI** deila Xyrem með öðrum.

Mikilvægar öryggisupplýsingar fyrir lækna og aðra heilbrigðisstarfsmenn

- Sjúklingurinn notar Xyrem til meðferðar á svefnflogum með máttleysisköstum.
- Xyrem getur valdið öndunar- og miðtaugakerfisbælingu, krömpum, geðrofstillvikum, þunglyndi og sjálfsvígstillhneigingum.
- Ópríóíð og barbitúröt á ekki að nota með Xyrem. Forðast á notkun annarra öndunar- og miðtaugakerfisbælandi lyfja. Gætið sérstakrar varúðar við notkun topiramats og valproats með Xyrem.
- Notkun Xyrem felur í sér hættu á misnotkun/rangnotkun/fíkn.
- Sjá Samantekt á eiginleikum lyfs fyrir Xyrem áður en ávísun á önnur lyf er gefin þessum sjúklingum.



UCB Nordic A/S

Arne Jacobsen Allé 15
2300 København S
sími: +45 32 462 400