

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Septabene lemon/elderflower 3 mg/1 mg munnsogstöflur benzydaminehydrochloride/cetylpyridiniumchloride

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.
- Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.
- Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Septabene lemon/elderflower og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Septabene lemon/elderflower
3. Hvernig nota á Septabene lemon/elderflower
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Septabene lemon/elderflower
6. Pakningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Septabene lemon/elderflower og við hverju það er notað

Septabene lemon/elderflower inniheldur virku efnin benzydaminehydrochloride og cetylpyridiniumchloride.

Septabene lemon/elderflower munnsogstafla er bólgueyðandi, verkjastillandi og sótthreinsandi lyf til staðbundinnar notkunar í munnhol. Septabene lemon/elderflower sótthreinsar munn og háls og dregur úr bólgueinkennum í hálsi, svo sem verk, roða, þrota, hita og skertri virkni.

Septabene lemon/elderflower er notað handa fullorðnum, unglungum og börnum eldri en 6 ára, til meðferðar á einkennum hálsbólgu sem tengjast vægum sýkingum í munni og hálsi.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga.

2. Áður en byrjað er að nota Septabene lemon/elderflower

Ekki má nota Septabene lemon/elderflower

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir benzydaminehydrochloride, cetylpyridiniumchloride eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).
- ekki má nota lyfið handa börnum yngri en 6 ára þar sem lyfjaformið hentar ekki fyrir þann aldurshóp.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað:

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir salisylötum (t.d. acetylsalicylsýru og salicylsýru) eða öðrum bólgueyðandi gigtarlyfjum (NSAID-lyfjum), skaltu ekki nota lyfið, þar sem benzydaminehydrochloride tilheyrir einnig flokki bólgueyðandi gigtarlyfja.
- ef þú ert með berkjuastma eða sögu um berkjuastma. Gæta skal varúðar í slíkum tilvikum.
- ef þú ert með opin sár eða fleiður í munni eða hálsi.

Ekki á að nota lyfið lengur en í 7 daga. Ef einkenni versna eða lagast ekki eftir 3 daga, eða ef önnur einkenni koma fram, t.d. hiti, skaltu ráðfæra þig við lækni.

Staðbundin notkun lyfja, einkum í langan tíma, getur valdið ertingu og ef það gerist þarf að hætta meðferðinni og hafa samband við lækni til að ákveða hentuga meðferð.

Ekki má nota lyfið samhliða eftum sem innihalda neikvætt hlaðnar jónir, svo sem eftum sem finna má í tannkremi, til að forðast óvirkjun þess. Því er ekki ráðlagt að nota lyfið strax fyrir eða eftir tannburstun.

Börn og ungligar

Ekki má nota Septabene lemon/elderflower handa börnum yngri en 6 ára þar sem lyfjaformið hentar ekki fyrir þann aldurshóp.

Notkun annarra lyfja samhliða Septabene lemon/elderflower

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Ekki á að nota önnur sótthreinsandi lyf samhliða Septabene lemon/elderflower.

Notkun Septabene lemon/elderflower með mat, drykk eða áfengi

Ekki á að taka Septabene lemon/elderflower með mjólk, þar sem mjólk dregur úr virkni lyfsins.

Ekki á að taka Septabene lemon/elderflower strax fyrir eða eftir neyslu matar eða drykkjar. Ekki á að neyta matar eða drykkjar í a.m.k. eina klukkustund eftir töku Septabene lemon/elderflower.

Meðganga og brjósttagjöf

Við meðgöngu, brjósttagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Notkun lyfsins er ekki ráðlögð á meðgöngu.

Ræða á brjósttagjöf við lækninn, sem mun ráðleggja um hvort hætta eigi brjósttagjöf eða hætta meðferð með Septabene lemon/elderflower.

Akstur og notkun véla

Septabene lemon/elderflower hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Septabene lemon/elderflower inniheldur ísómalt (E953), bútýlhýdroxýanisól (E320), natríumbensóat (E211) og natríum

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er notað.

Bútýlhýdroxýanisól getur valdið staðbundnum húðviðbrögðum (t.d. snertihúðbólgu) eða ertingu í auga og slímhúðum.

Lyfið inniheldur allt að 0,00075 mg af natríumbensóati í hverri munnsogstöflu, sem getur valdið staðbundinni ertingu.

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverri munnsogstöflu, þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust.

3. Hvernig nota á Septabene lemon/elderflower

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Fullorðnir

Ráðlagður skammtur er 3–4 munnsogstöflur á dag. Leysa á eina munnsogstöflu hægt upp í munninum á 3 til 6 klukkustunda fresti.

Unglingar eldri en 12 ára

Ráðlagður skammtur er 3–4 munnsogstöflur á dag. Leysa á eina munnsogstöflu hægt upp í munninum á 3 til 6 klukkustunda fresti.

Börn á aldrinum 6 til 12 ára

Ráðlagður skammtur er 3 munnsogstöflur á dag. Leysa á eina munnsogstöflu hægt upp í munninum á 3 til 6 klukkustunda fresti. Fullorðinn þarf að fylgjast með notkun munnsogstaflna hjá börnum á aldrinum 6 til 12 ára.

Börn yngri en 6 ára

Börn yngri en 6 ára mega ekki nota Septabene lemon/elderflower.

Ekki á að nota stærri skammta en tilgreindir eru.

Ekki á að taka Septabene lemon/elderflower strax fyrir eða eftir neyslu matar eða drykkjar.

Ekki á að neyta matar eða drykkjar í a.m.k. eina klukkustund eftir töku lyfsins.

Ekki er ráðlagt að nota lyfið strax fyrir eða eftir tannburstun.

Meðferðarlengd

Ekki á að nota lyfið lengur en í 7 daga. Ef einkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga, eða ef önnur einkenni koma t.d. hiti, skaltu ráðfæra þig við lækni.

Ráðfærðu þig við lækninn ef kvíllinn kemur upp á ný eða ef vart verður við breytingar á einkennum hans.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal tafarlaust hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef gleymist að taka Septabene lemon/elderflower

Ekki á að tvöfalta skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Ef vart verður við einhverja af eftirfarandi alvarlegum aukaverkunum á að hætta notkun Septabene lemon/elderflower og hafa tafarlaust samband við lækni:

- ofnæmisviðbrögð (ofnæmi),
- alvarleg ofnæmisviðbrögð (bráðaofnæmislost), meðal einkenna geta verið öndunarerfiðleikar, brjóstverkur eða þyngsli fyrir brjósti og/eða sundl- eða yfirliðstilfinning, mikill kláði í húð eða upphleyptir hnúðar í húð, þroti í andliti, vörum, tungu og/eða koki, og geta slík viðbrögð verið lífshættuleg.

Tíðni þessara aukaverkana er ekki þekkt.

Mjög sjaldgæfar (geta komið fram hjá allt að 1 af hverjum 1.000 einstaklingum):

- ofsakláði, aukin viðbrögð húðar við sórljósi (ljósnæmi),
- skyndileg og stjórnlaus þrenging loftvega í lungum (berkjukrampi).

Koma örsjaldan fyrir (hjá allt að 1 af hverjum 10.000 einstaklingum):

- staðbundin erting í munnholi, sviðatilfinning í munnholi.

Tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum):

- sviði í slímhúð í munni, tap á skynhrifum (deyfing) í slímhúð í munni.

Þessar aukaverkanir eru yfirleitt tímabundnar. Þó er ráðlagt að hafa samband við lækni eða lyfjafræðing ef þær koma fram.
Með því að fylgja leiðbeiningum í fylgiseðlinum er hægt að draga úr hættu á aukaverkunum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einneig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Septabene lemon/elderflower

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki þarf að geyma lyfið við sérstök hitaskilyrði.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Septabene lemon/elderflower inniheldur

- Virku innihaldsefnin eru benzodaminehydrochloride og cetylpyridiniumchloride. Hver munnsogstafla inniheldur 3 mg af benzodaminehydrochloride og 1 mg af cetylpyridiniumchloride.
- Önnur innihaldsefni eru piparmintuolía, levómentól, súkralósi (E955), sítrónusýra (E330), ísómalt (E953), sítrusbragðefni (inniheldur bútýlhýdroxýanisól (E320)), ylliblómabragðefni, kúrkúmín (E100) (inniheldur natríumbensóat (E211)), koparfléttur klórófyllína (E141). Sjá kafla 2 „Septabene lemon/elderflower inniheldur ísómalt (E953), bútýlhýdroxýanisól (E320), natríumbensóat (E211) og natríum“.

Lýsing á últiti Septabene lemon/elderflower og pakkningastærðir

Kringlóttar munnsogstöflur með skáskornum brúnum og hrjúfu yfirborði, ljósgrænar eða grænar á lit. Hugsanlegt er að hvítir blettir, misjöfn litun eða loftbólur séu í töflumassanum og að lítil skörð séu í töflubrúnunum. Þvermál munnsogstöflu: 18 mm – 19 mm, þykkt: 7 mm – 8 mm.

Septabene lemon/elderflower er fáanlegt í öskjum með 8, 16, 24, 32 eða 40 munnsogstöflum í þynnum.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

Markaðsleyfishafi

KRKA, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slóvenía

Framleiðandi

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slóvenía
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strase 5, 27472 Cuxhaven, Pýskaland

Vinsamlega hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa ef óskað er frekari upplýsinga um lyfið

LYFIS ehf.

Sími: 534 3500

Netfang: lyfis@lyfis.is

Pessi fylgiseðill var síðast uppfærður í maí 2024.

Ítarlegar upplýsingar um lyfið eru birtar á vef Lyfjastofnunar, www.serlyfjaskra.is.