

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Carbocain adrenalín 10 mg/ml + 5 míkrog/ml stungulyf, lausn

mepivacainhýdróklóríð og adrenalín

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
- Látið lækning, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Carbocain adrenalín og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Carbocain adrenalín
3. Hvernig nota á Carbocain adrenalín
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Carbocain adrenalín
6. Þakkingar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Carbocain adrenalín og við hverju það er notað

Carbocain adrenalín stungulyf, lausn inniheldur virka efnið mepivacainhýdróklóríð sem er staðdefyandi efni og virka efnið adrenalín sem lengir verkun mepivacainhýdróklóríðs. Lyfið er notað við verkjastillingu og til þess að deyfa hluta líkamans við skurðaðgerð. Lyfið kemur í veg fyrir að taugarnar á meðferðarsvæðinu sendi boð um verki, hita og kulda. Þess vegna finnur þú ekki fyrir verkjum á svæðinu en getur þó fundið fyrir þrýstingi og snertingu.

2. Áður en byrjað er að nota Carbocain adrenalín

Verið getur að lækningin hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Carbocain adrenalín:

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir mepivacainhýdróklóríði eða öðrum staðdefyfilyfjum, adrenalíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).
- ef um er að ræða ofnæmi fyrir metýl- og/eða própýlparahýdroxýbensóati (metýlparaben/própýlparaben) eða fyrir para-amino-benzosýru (PABA).
- ef um er að ræða ofnæmi fyrir natríummetabísúlfíti.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá læknum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Carbocain adrenalín er notað ef þú ert:

- með sjúkdóminn porfyríu, sem eykur magn porfyríns í blóði, þvagi, galli og hægðum. Einkennin geta verið kviðverkir, uppköst, þaninn kviður, hægðatregða, hiti og húðútbrot oft með blöðrum
- með hjarta- og æðasjúkdóma eða skerta hjartastarfsemi
- með alvarlegan lifrar- eða nýrnasjúkdóm
- aldraður/öldruð
- lasburða
- barn. Þá þarf að minnka skammtinn
- í meðferð með lyfjum sem eru skyld staðdefyfilyfjum eða lyfjum við hjartsláttartruflunum, þar sem þau lyf geta aukið óæskileg áhrif Carbocain adrenalín

- með of háan blóðþrýsting
- með sjúkdóm í skjaldkirtli (skjaldvakæitrun)
- með sykursýki eða annan sjúkdóm eða kvilla sem getur versnað við notkun adrenalíns.

Börn

Carbocain adrenalín má nota hjá börnum frá 2 mánaða aldri. Skammtar hjá börnum eiga að fara eftir aldri og þyngd.

Notkun annarra lyfja samhliða Carbocain adrenalín

Látid lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Gæta skal varúðar við notkun lyfsins ef það er notað samhliða eftirfarandi lyfjum:

- öðrum staðdeyfilyfjum
- lyfjum sem eru byggingalega skyld staðdeyfilyfjum, t.d. nokkrum hjartalyfjum
- lyf við brjóstsviða og sárum í maga og þörmum (svo sem címetidín)
- sefandilyfjum og róandi lyfjum
- sýtókróm P450 1A2 hemlum
- lyfjum notuð við háþrýstingi (própranolól).

Þar sem lyfið inniheldur adrenalín á ekki að nota Carbocain adrenalín ef þú ert í meðferð með þríhringlaga þunglyndislyfjum, alkalóíðum af ergotgerð og geðrofslyfjum.

Gæta skal varúðar þegar lausnir sem innihalda adrenalín eru notaðar samhliða eftirfarandi:

- svæfingarlyfjum til innöndunar þar sem hætta er á alvarlegri óreglu á þúlsi.
- betablokkum eins og própranolól sem geta valdið alvarlegri blóðþrýstingshækkun og hægum þúlsi.

Meðganga og brjóstgjöf

Við meðgöngu, brjóstgjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Nota má Carbocain adrenalín á meðgöngu en ekki er mælt með notkun þess við fæðingu þar sem aukin hætta er á eiturverkunum á fóstur og nýbura.

Carbocain adrenalín getur skilst út í brjóstamjólk en í það litlu magni að engin hætta er á áhrifum á barn á brjósti. Ekki er vitað hvort adrenalín skilst út í brjóstamjólk en ólíklegt er að það hafi áhrif á barn á brjósti.

Akstur og notkun véla

Auk deyfandi áhrifa getur staðdeyfing haft mjög væg áhrif á samhæfingu og árvekni. Þú þarft að vera vakandi fyrir því hvaða áhrif lyfið hefur á þig.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Carbocain adrenalín inniheldur metýlparahýdroxýbensóat (E218), natríummetabísúlfít (E223) og natríum

Carbocain adrenalín inniheldur metýlparahýdroxýbensóat. Getur valdið ofnæmisviðbrögðum (hugsanlega síðkomnum) og í undantekningartilvikum, berkjukrampa.

Carbocain adrenalín inniheldur natríummetabísúlfít. Getur í undantekningartilvikum valdið ofnæmisviðbrögðum og berkjukrampa.

Carbocain adrenalín stungulyf 10 mg/ml + 5 mikróg/ml inniheldur um 0,13 mmól (um 3,0 mg) natríum í hverjum ml. Sjúklingar á natríumskertu mataræði þurfa að hafa þetta í huga.

3. Hvernig nota á Carbocain adrenalín

Notið lyfið alltaf eins og lækinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá læknum eða lyfjafræðingi.

Lækinn ákveður skammt Carbocain adrenalín sem fer eftir tegund deyfingar, svæðinu sem á að deyfa og lengd deyfingar.

Notkun handa börnum

Carbocain adrenalín má nota hjá börnum frá 2 mánaða aldri. Skammtar hjá börnum eiga að fara eftir aldri og þyngd.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Hafðu samband við lækinn, sjúkrahús eða apótek ef þú heldur að þú hafir fengið of mikið Carbocain adrenalín, eða meira en lækinn hefur ávísað (og þú finnur fyrir ónotum).

Ef gleymist að nota Carbocain adrenalín

Hafðu samband við lækinn eða hjúkrunarfræðinginn ef þú heldur að þú hafir ekki fengið Carbocain adrenalín.

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef hætt er að nota Carbocain adrenalín

Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir og aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 1.000 sjúklingum)

- Skyndileg húðútbrot, öndunarerfiðleikar og yfirlið (innan mínútna til klukkustunda) vegna ofnæmis (bráðaofnæmisviðbrögð/lost). Getur verið lífshættulegt. Hringdu í 112
- Hjartastopp. Hringdu í 112
- Öndunarbíln, bláleitar varir og neglur. Hringdu í 112.

Aukaverkanir þar sem tíðni er ekki þekkt (ekki hægt að áætla tíðni út frá fyrirbyggjandi gögnum)

- Andnað, hröð, korrandi öndun, verkur og óþægindi fyrir brjósti ásamt hósta með froðukenndum og hugsanlega blóðugum uppgangi vegna vökva í lungum. Hafðu strax samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringdu jafnvel í 112.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar

Mjög algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá fleiri en 1 af hverjum 10 sjúklingum)

- Ógleði
- Sundl, jafnvel yfirlið vegna lágs blóðþrýstings.

Algengar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum)

- Hægur púls. Getur orðið alvarlegt. Ef púls verður mjög hægur eða þú finnur fyrir ónotum eða yfirliðstilfinningu skaltu hafa samband við lækni eða bráðamóttöku. Hringdu jafnvel í 112
- Stingir og náladofi eða dofi í húð
- Sundl
- Uppköst

- Of hár blóðþrýstingur. Hafðu samband við lækinn. Nauðsynlegt er að meðhöndla of háan blóðþrýsting. Mikil blóðþrýstingshækkun er alvarleg.

Sjaldgæfar aukaverkanir (geta komið fyrir hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 sjúklingum)

- Einkenni um eitruverkun í miðtaugakerfi (krampi, stingir og náladofi eða dofi í húðinni í kringum munninn, dofi í tungu, ofurnæm heyrn, sjóntruflanir, skjálfti, suð fyrir eyrum, taltruflanir, bæling miðtaugakerfis). Getur verið eða orðið alvarlegt. Hafðu samband við lækinn.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir og aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (geta komið fyrir hjá færri en 1 af hverjum 1.000 sjúklingum)

- Óreglulegur púls. Getur verið eða orðið alvarlegt. Hafðu samband við lækinn
- Verkir og truflanir á snertiskyni vegna bólgu í taugum
- Taugaskemmdir í hand- og fótleggjum
- Bólga í himnu sem verndar hrygg og heila (skúmbólga)
- Tvísýni. Getur orðið alvarlegt. Hafðu samband við lækinn eða jafnvel bráðamóttöku
- Ofnæmisviðbrögð.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækinn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Carbocain adrenalin

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum á eftir EXP. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram. Notið í seinasta lagi 3 dögum eftir opnun.

Geymið við 2 °C – 15 °C. Má ekki frjósa. Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Carbocain adrenalin inniheldur

- Virka innihaldsefnið er mepivacainhýdróklóríð, adrenalín sem adrenalíntartrat
- Önnur innihaldsefni eru saltsýra (til að stilla pH), natriumklóríð, natriumhýdroxíð (til að stilla pH), natriummetabísúlfít (E223), metýlparahýdroxybensóat (E218), vatn fyrir stungulyf.

Lýsing á útliti Carbocain adrenalin og pakkningastærðir

Carbocain adrenalin stungulyf er sæfð vatnslaun með pH 3,3-5,0.

Markaðsleyfishafi

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Kaupmannahöfn S, Danmörk

Framleiðandi

Recipharm Monts, Frakkland

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í september 2025.