

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

1. HEITI LYFS

Carbocain adrenalin 10 mg/ml stungulyf, lausn.

2. INNIHALDSLÝSING

Mepivacainhýdróklóríð 10 mg/ml
Adrenalín 5 míkrog/ml sem adrenalíntartrat.

Hjálparefni, sem lækjurinn skal vera meðvitaður um:

Natríum

Metýlparahýdroxýbenzóat (E218)

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Stungulyf, lausn.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

Leiðslu- og íferðardeyfing.

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Skammtar

Fullorðnir og börn eldri en 12 ára:

Taflan hér á eftir er til leiðbeiningar um skammta við algengari deyfingar hjá fullorðnum heilbrigðum einstaklingum. Reynsla læknisins og þekking hans á líkamlegu ástandi sjúklingsins eru mikilvæg við ákvörðun á hæfilegum skammti. Þegar beitt er deyfingu til lengri tíma, t.d. með endurtekinni lyfjagjöf, skal hafa í huga hættu á að þéttni í plasma nái eitrunarmörkum og hættu á staðbundnum taugaskaða.

Tafla 1 Skammtaleiðbeiningar

Tegund deyfingar	Styrkur	Skammtur		Verkun hefst eftir (mín.)	Verkunarlengd (klst.)
	mg/ml	ml	mg		
Staðdeyfing við skurðaðgerðir					
Innanliðardeyfing ¹⁾	5	≤ 60	≤ 300	5-10	30-60 mín. eftir útskolun
	10	≤ 40	≤ 400	5-10	
Svæðisdeyfing (t.d. deyfing smátauga og íferðardeyfing)					
Staðbundin íferðardeyfing	5	≤ 80	≤ 400	1-2	2-3
	10	≤ 40	≤ 400	1-2	3-4
Millirifjadeyfing (hver taug) Hámarksfjöldi tauga sem deyfðar eru á sama tíma ætti að vera < 10	10	4	≤ 400	3-5	3-4
Aftan augnknattar (retrobulbar) Umhverfis augnknött (peribulbar)	20	4	80	3-5	2-4
	10	10-15	100-150	3-5	2-4

Tegund deyfingar	Styrkur	Skammtur		Verkun hefst eftir (mín.)	Verkunar- lengd (klst.)
	mg/ml	ml	mg		
Deyfing stórtauga					
Við legháls (hvor hlið) (ekki ráðlagt við fæðingar)	10	10	100	3-5	2-2,5
Armflækja Við holhönd (Plexus brachialis axillaris)	10	40-50	400-500	15-30	3-4
Í léttivöðva ofan viðbeins (supraclavicular, inter-scalene) og neðan viðbeins í grennd við æð (subclavian perivascular)	10	30-40	300-400	15-30	3-4
Settaug (sciatic)	20	15-20	300-400	15-30	3-4
3 í 1 (Femoral, obturator og lateral cutaneous)	10	30-40	300-400	15-30	2-4

Athugasemdir

- Eftir markaðssetningu hefur verið greint frá liðbrjóskeyðingu hjá sjúklingum sem, eftir skurðaðgerð, hafa fengið staðdeyfilyf með samfelldu innrennsli í lið. Slík notkun fellur ekki undir viðurkenndar ábendingar fyrir notkun Carbocain adrenalin (sjá kafla 4.4). Carbocain adrenalin stungulyf, lausn, í fjölskammta hettuglösom, inniheldur rotvarnarefnið metýlparahýdroxybenzóat (metýlparaben) og á því ekki að nota sem deyfing í mænugöng, heilahólf (intracisternal) eða í augnknött eða svæði aftan augnknattar (intra- eða retrobulbar).

Í töflunum er að finna þá skammta sem taldir eru gefa ásættanlega deyfingu og líta skal á þá til leiðbeiningar um notkun fyrir fullorðna. Breytileiki er á milli einstaklinga hvað varðar upphaf verkunar og verkunarlengd. Tölurnar í dálkinum „Skammtur“ sýna bil áætlaðs meðalskammts.

Upplýsingar í viðurkenndum fagbókum skal hafa til hliðsjónar um þá þætti, sem geta haft áhrif á sérhæfða deyfingartækni og þarfir einstakra sjúklinga. Lengja má verkunartíma með því að nota lausnir sem innihalda adrenalín (sjá töflu 1, skammtaleiðbeiningar). Athugið. Hafa skal í huga hættu á altækum áhrifum þegar notaðar eru lausnir sem innihalda mikið magn af adrenalíni.

Varast skal að nota óþarflega stóra skammta af staðdeyfilyfjum. Almenn gildir um deyfingu við skurðaðgerðir að nota þarf hærri styrkleika og skammta. Við deyfingu smátauga eða þegar ekki er þörf á mikilli deyfingu er lægri styrkleiki notaður. Rúmmál lyfs sem notað er hefur áhrif á það hversu mikið deyfingin breiðist út.

Reynsla sýnir að 1.000 mg gefin á 24 klst. tímabili þolast vel hjá meðalvöxnum fullorðnum einstaklingum.

Börn

Börn frá 2 mánaða til 12 ára:

Skammtarnir eru gefnir upp í töflu 2. Skammtana í töflunni skal líta á sem leiðbeiningar fyrir notkun handa börnum. Breytileiki getur verið á milli einstaklinga. Hjá börnum sem eru mjög þung er oft nauðsynlegt að draga úr skömmtum hlutfallslega og skal miða þá við kjörþyngd. Hafa á til hliðsjónar upplýsingar úr fagbókum til að greina þarfir hvers sjúklings fyrir sig og þá þætti sem geta haft áhrif á sérhæfða deyfingartækni.

Fyrirliggjandi upplýsingum er lýst í köflum 4.8, 5.1 og 5.2, en ekki er hægt að ráðleggja skammta við liðspeglun (arthroscopy) eða við staðbundna deyfingu í bláæð (Bier block).

Hjá börnum á aldrinum 2 mánaða til 12 ára skal reikna út skammta Carbocains með adrenalíni út frá

þyngd að hámarki 7 mg/kg. Kjörstyrkur adrenalíns í börnum hefur ekki verið nákvæmlega ákvarðaður.

Þegar styrkur og rúmmál æskilegrar deyfingar er ákvarðað skal ávallt reikna út heildarskammt mepivacains til að tryggja að hann sé minni en ráðlagður hámarksskammtur. Mepivacain má ekki gefa nýburum yngri en 6 vikna vegna hægari umbrota í lifur.

Tafla 2 Skammtaráðleggingar fyrir börn

	Styrkur mg/ml	Rúmmál ml/kg með adrenalíni	Skammtur mg/kg með adrenalíni	Verkun hefst eftir (mín.)	Verkunarlengd (klst.) með adrenalíni
Dauslæg utanbastsdeyfing^{a)} (deyfing fyrir neðan T12)	10	0,5 ^{b)}	≤7	10-15	1-3
Deyfing á stórtaugum^{a)} (armflækja við holhönd (Plexus brachialis axillaris))	10	0,3-0,5	≤7	10-15	1-3
Svæðisdeyfing^{a)} (t.d. deyfing smátauga og íferðardeyfing)	5-10	0,07-0,2 ^{c)}	≤7	10-15	-

Athugasemdir

^{a)} Hafa skal í huga bæði aldur og þyngd þegar skammtar eru ákvarðaðir.

^{b)} Magn fyrir hverja deyfingu má ekki vera meira en 20 ml, gildir fyrir alla sjúklinga.

^{c)} Magn fyrir hverja deyfingu má ekki vera meira en 10 ml, gildir fyrir alla sjúklinga.

Carbocain stungulyf, lausn sem inniheldur rotvarnarefnið metýlparahýdroxýbenzóat (metýlparaben) eða metýlparaben í blöndu með própýlparahýdroxýbenzóati (própýlparabeni), þ.e. sem er í fjölskammta hettuglösom, má ekki nota við deyfingu í mænuvökva, í heilahólf (intracisternal) eða í augnknött eða aftan augnknattar.

Sérstakir sjúklingahópar

Skert lifrarstarfsemi

Ekki þarf að minnka skammta fyrir deyfingu í tengslum við skurðaðgerðir hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi. Við langtímadeyfingu, t.d. með endurtekinni lyfjagjöf, skal minnka endurtekna skammta af mepivacaini um 50% hjá sjúklingum með alvarlegan lifrarsjúkdóm (flokkur Child-Pugh C) og ekki má gefa meira en 750 mg af mepivacaini yfir 24 klst. (sjá kafla 4.4).

Skert nýrnastarfsemi

Ekki þarf að minnka skammta hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi við deyfingu í allt að 24 klst. (sjá kafla 4.4 og 5.2).

Lyfjagjöf

Til að koma í veg fyrir gjöf í æð fyrir slysi skal endurtaka útsog vökva (aspiration) fyrir og meðan á gjöf heildarskammts stendur, sem skal gefa hægt eða í nokkrum skömmtum með hraðanum 100-200 mg/mín. Fylgjast skal vel með lífsmerkjum sjúklings á meðan og halda uppi óslitnum samræðum við hann. Gjöf lyfsins í æð fyrir slysi sést á tímabundnum auknum hjartslætti og gjöf fyrir slysi í mænu göng sést á einkennum mænu deyfingar. Ef einkenni um eitrun verður vart skal stöðva lyfjagjöf án tafar.

4.3 Frábendingar

Ofnæmi fyrir virku efnunum, staðdeyfilyfjum af amíðflokki eða einhverju hjálparefnanna sem talin eru upp í kafla 6.1.

Ofnæmi fyrir metýl- og/eða própýlparahýdroxýbenzóati (metýl-/ própýlparabeni) eða umbrotsefni þeirra, para-amínó-benzósýru (PABA). Fordast skal notkun mepivacainlausna sem innhalda paraben hjá sjúklingum með ofnæmi fyrir staðdeyfilyfjum af estergerð eða umbrotsefni þess, PABA.

Ofnæmi fyrir natríummetabísúlfíti.

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Svæðisdeyfingar eða staðdeyfingar skulu einungis gerðar þar sem endurlífgunarbúnaður er til staðar. Við meiriháttar deyfingar eða þegar stórir skammtar eru notaðir á að setja upp nál í bláæð áður en staðdeyfilyfið er gefið. Viðkomandi læknir á að hafa hlotið viðeigandi þjálfun í framkvæmd fyrirhugaðrar aðgerðar og hafa góða þekkingu á greiningu og meðferð aukaverkana, altækum (systemic) eiturverkunum eða öðrum hugsanlegum fylgikvillum (sjá kafla 4.9).

Vissar staðdeyfingar geta tengst alvarlegum aukaverkunum, óháð því hvaða staðdeyfilyf er notað, þ.e.:

- Lyfjagjöf aftan augnknattar (retrobulbar) getur örsgaldan náð til innanskúmsrýmis (cranial subarachnoid space) og valdið tímabundinni blindu, losti (vegna hjartabilunar), öndunarstöðvun, krömpum o.s.frv. Greina verður þessi einkenni og veita tafarlausa meðferð.
- Gjölf staðdeyfilyfs aftan við og umhverfis augnknött hefur í för með sér litla hættu á viðvarandi vanvirkni augnvöðva. Þetta gerist aðallega af völdum áverka og/eða staðbundinna eiturverkana á vöðva og/eða taugar.

Alvarleiki slíkra áhrifa á vefi er tengdur því hversu mikill áverkinn er, styrkleika staðdeyfilyfsins og þeim tíma sem vefur er útsettur fyrir staðdeyfilyfinu. Vegna þessara ástæðna skal, eins og með öll staðdeyfilyf, nota eins lága styrkleika og skammta og unnt er, sem veita viðunandi deyfingu. Æðaherpanði lyf geta aukið verkun á vefi og skulu einungis notuð þegar það á við.

- Eftir markaðssetningu hefur verið greint frá liðbrjóskeyðingu hjá sjúklingum sem, eftir skurðaðgerð, hafa fengið staðdeyfilyf með samfelldu innrennsli í lið. Oftast var um að ræða liðbrjóskeyðingu í axlarlið. Ekki var hægt að staðfesta beint orsakasamhengi, vegna annarra samhliða orsakapátta og ósamræmis í vísindalegum gögnum varðandi verkunarmátann. Carbocain adrenalín er ekki viðurkennt til notkunar sem samfellt innrennsli í lið.
- Á svæði höfuðs og háls getur gjöf fyrir slysi í slagæð valdið alvarlegum aukaverkunum jafnvel við litla skammta.

Þó að svæðisdeyfing sé oftast ákjósanlegasta aðferðin til deyfingar þarf að gæta sérstakrar varúðar hjá ákveðnum sjúklingum til þess að draga út hættu á alvarlegum aukaverkunum:

- Sjúklingar með gáttasleglarof að hluta til eða að fullu, vegna þess að staðdeyfilyf geta truflað leiðslukerfi hjartans.
- Sjúklingar með langt genginn lifrarsjúkdóm eða verulega skerta nýrnastarfsemi.

Gögn um lidocain frá sjúklingum með langt genginn lifrarsjúkdóm (Child-Pugh flokkur C) gefa til kynna að úthreinsun geti minnkað um u.þ.b. 50% (sjá kafla 4.2).

Einungis er búist við minnkaðri úthreinsun á mepivacaini sem skiptir máli klínískt hjá sjúklingum með verulega skerta nýrnastarfsemi (CL(cr) <30 ml/mín.) sem eru ekki í blóðskilun.

Ekki er búist við að skert úthreinsun hafi áhrif á tíðni eiturverkana af völdum mikillar plasmabéttni eftir staka skammta í tengslum við deyfingu fyrir skurðaðgerð. Við langvarandi nýrnabilun er úthreinsun PPX umbrotsefnisins sem skilst út um nýrun hins vegar skert og uppsöfnun getur átt sér stað eftir endurtekna skammta (sjá kafla 4.2).

- Aldraðir eða lasburða sjúklingar.
- Fylgjast skal vel með sjúklingum sem fá meðferð með lyfjum við hjartsláttartruflunum af flokki III (t.d. amiodarón) og taka hjartalínurit, þar sem áhrif á hjarta geta verið samleggjandi.
- Carbocain stungulyf getur valdið porfýríu og skal einungis gefa sjúklingum með bráða porfýríu þegar ekki er hægt að beita öðrum öruggari aðferðum. Gæta skal varúðar þegar sjúklingum í áhættu fyrir porfýríu er gefið lyfið.

Lausnir sem innihalda adrenalín skulu gefnar með varúð sjúklingum með alvarlegan eða ómeðhöndlaðan háþrýsting, ófullnægjandi meðhöndlað skjaldvakaóhóf, hjartasjúkdóm með blóðþurrð, gáttasleglarof, skert heilablóðflæði, langt gengna sykursýki eða einhvern annan sjúkdóm sem getur versnað af völdum adrenalíns. Þessar lausnir skulu einnig notaðar með varúð og í mjög takmörkuðu magni í líkamssvæði sem nærð eru af endaslagæðum, eins og fingur og tær eða þar sem blóðflæði er takmarkað af öðrum ástæðum (sjá einnig kafla 4.5).

Staðdeyfilausnir sem innihalda rotvarnarefni (hettuglös), á ekki að gefa sem miðlægar leiðsludeyfingar.

Carbocain adrenalín lausnir innihalda natríummetabísúlfít, súlfít samband, sem getur valdið ofnæmi þ.á m. bráðaofnæmi og lífshættu eða í minna alvarlegum tilvikum astmakasti hjá sumum næmum einstaklingum. Heildartíðni súlfítofnæmis er óþekkt en er sennilega lág. Ofnæmi fyrir súlfíti er algengara hjá sjúklingum með astma heldur en þeim sem ekki eru með astma.

Carbocain adrenalín inniheldur metýlparahýdroxýbenzóat, sem getur valdið ofnæmi (geta komið fram eftir að meðhöndlun lýkur) og í mjög sjaldgæfum tilvikum öndunarerfiðleikum.

Carbocain adrenalín 10 mg/ml stungulyf inniheldur u.þ.b. 0,13 mmól (u.þ.b. 3,0 mg) af natríum í ml. Sjúklingar á natríumskertu mataræði þurfa að hafa þetta í huga.

Carbocain adrenalín stungulyf, lausn, í fjölskammta hettuglösum, inniheldur rotvarnarefnið metýlparahýdroxýbenzóat (metýlparaben) og á því ekki að nota sem deyfing í mænugöng, heilahólf (intracisternal) eða í augnknött eða svæði aftan augnknattar (intra- eða retrobulbar).

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Almennt skal forðast að nota lyf sem innihalda adrenalín eða nota þau með varúð hjá sjúklingum sem fá þríhringlaga þunglyndislyf, þar sem alvarlegur, langvinnur háþrýstingur getur komið fram. Samtímis notkun lyfja sem innihalda adrenalín og alkalóíða af ergotgerð geta valdið alvarlegum, viðvarandi háþrýstingi og hugsanlega hjarta- og heilaáföllum. Gedrofslyf eins og fenótíazín og bútýrophenón geta dregið úr eða vegið upp æðapregjandi áhrif adrenalíns.

Lyf sem innihalda adrenalín skulu notuð með varúð hjá sjúklingum, sem svæfðir eru með svæfingarlyfi til innöndunar, vegna hættu á alvarlegum hjartsláttartruflunum.

Ósérhæfðir betablokkar eins og própranolól auka æðapregjandi áhrif adrenalíns, sem getur leitt til alvarlegs háþrýstings og hægsláttar.

Gæta skal varúðar við notkun mepivacains hjá sjúklingum sem fá meðferð með öðrum staðdeyfilyfjum eða lyfjum sem að byggingu eru skyld staðdeyfilyfjum af flokki amíða t.d. ákveðin lyf við hjartsláttartruflunum eins og lídókaín, þar sem eiturverkanir eru samleggjandi. Sérstakar rannsóknir á milliverkun mepivacains og lyfja við hjartsláttartruflunum af flokki III (t.d. amíóðarón) hafa ekki verið gerðar, en ráðlagt er að gæta varúðar (sjá einnig kafla 4.4).

Címetidín minnkar úthreinsun mepivacains, hugsanlega gæti þurft að minnka skammta.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstgjöf

Meðganga

Má nota á meðgöngu.

Gera má ráð fyrir að stórum hópi þungaðra kvenna og kvenna á barneignaraldri hafi verið gefið mepivacain. Enn sem komið er hefur ekki verið tilkynnt um neinar sérstakar truflanir á æxlun t.d. engin aukin tíðni á vansköpun.

Ekki er ráðlagt að nota Carbocain adrenalín til að deyfa leghálsinn í fæðingu eða sem utanbastsdeyfingu í keisaraskurði þar sem mepivacain berst yfir í fylgju í tiltölulega miklu magni og þar sem það umbrotnar hægt í nýburum er aukin hættu á eiturverkunum á fóstur og nýbura.

Brjóstagjöf

Eins og við á um önnur staðdeyfilyf getur mepivacain skilist út í brjóstamjólk, en í svo litlum mæli að almennt er engin hætt á að það hafi áhrif á nýbura.

Ekki er vitað hvort adrenalín berist í brjóstamjólk, en ólíklegt er að það hafi áhrif á barn á brjósti.

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Fyrir utan bein áhrif deyfingar, geta staðdeyfilyf haft lítills háttar áhrif á dómgreind (mental function) og samhæfingarhæfni jafnvel þótt eituverkanir á miðtaugakerfi séu ekki sjáanlegar og geta þau því tímabundið haft truflandi áhrif á hreyfingu og árvekni.

4.8 Aukaverkanir

Aukaverkanir af völdum Carbocain adrenalín eru svipaðar og eftir önnur staðdeyfilyf af flokki amíða. Aukaverkanir af völdum lyfsins sjálfs er erfitt að greina frá lífeðlisfræðilegum áhrifum af deyfingu tauganna (t.d. blóðþrýstingslækkun, hægum hjartslætti) og beinna áverka (t.d. taugaáverkar) eða óbeinna áverka vegna nálarstungunnar.

Hjarta Algengar ($\geq 1/100$ til $< 1/10$) Mjög sjaldgæfar – koma örsjaldan fyrir ($< 1/1.000$)	Hægsláttur. Hjartastopp, hjartsláttartruflanir.
Taugakerfi Algengar ($\geq 1/100$ til $< 1/10$) Sjaldgæfar ($\geq 1/1.000$ til $< 1/100$) Mjög sjaldgæfar – koma örsjaldan fyrir ($< 1/1.000$)	Náladofi, sundl. Einkenni eitrunar frá miðtaugakerfi (krampar, breytt húðskyn umhverfis munn, doði í tungu, of næm heyrn, sjóntruflanir, skjálfti, suð fyrir eyrum, taltruflanir, bæling miðtaugakerfis) Taugakvilli, áverkar á útlægar taugar, skúmbólga.
Augu Mjög sjaldgæfar – koma örsjaldan fyrir ($< 1/1.000$)	Tvísýni.
Öndunarfæri, brjósthol og miðmæti Mjög sjaldgæfar ($< 1/1.000$)	Öndunarbæling.
Meltingarfæri Mjög algengar ($\geq 1/10$) Algengar ($\geq 1/100$ til $< 1/10$)	Ógleði. Uppköst.
Æðar Mjög algengar ($\geq 1/10$) Algengar ($\geq 1/100$ til $< 1/10$)	Lágþrýstingur. Háþrýstingur.
Ónæmiskerfi Mjög sjaldgæfar – koma örsjaldan fyrir ($< 1/1.000$)	Ofnæmi, bráðaofnæmi/lost.

Bráðar altækar (systemic) eitranir

Altækar eiturvefkanir koma aðallega fram í miðtaugakerfi og hjarta og æðakerfi. Aukaverkanirnar koma fram vegna hárrar blóðþéttni staðdeyfilyfsins sem getur verið af völdum inndælingar í æð (fyrir slysi), ofskömmtnar eða óvenju hraðs frásogs frá æðaríkjum svæðum, sjá einnig kafla 4.4. Aukaverkanir af öllum staðdeyfilyfjum af amíðflokki á miðtaugakerfi eru sambærilegar, en aukaverkanir á hjarta og æðar eru háðari einstökum lyfjum bæði með tilliti til eðlis og alvarleika þeirra.

Eitrun í miðtaugakerfi kemur fram smám saman með stigvaxandi alvarleika einkenna. Fyrstu einkenni eru yfirleitt breytt húðskyn í kringum munn, doði í tungu, vönkun, of næm heyrn og suð fyrir eyrum. Sjóntruflanir og vöðvaskjálfti eru alvarlegri og fyrirboði almennra krampa. Þessum einkennum má ekki rugla saman við einkenni taugaveiklunar. Meðvitundarleysi og flogakrampar geta komið í kjölfarið og geta varað í fáar sekúndur upp í nokkrar mínútur. Við krampa kemur fljótt fram súrefnisskortur í vefjum og koltvísýringshækkun vegna aukinnar vöðvavirkni, ásamt truflunum á eðlilegri öndun og þrenginga í öndunarferum. Í alvarlegum tilvikum getur öndun stöðvast. Blóðsýring, blóðkalíumhækkun, blóðkalíumlækkun og súrefnisskortur í vefjum auka og lengja eiturvekun staðdeyfilyfja.

Bati kemur fram vegna endurdreifingar staðdeyfilyfsins og umbrotum þess. Bati getur verið hraður nema ef mjög stórir skammtar af lyfinu hafa verið gefnir með inndælingu.

Áhrif á hjarta og æðakerfi geta komið fram í alvarlegum tilvikum. Lágþrýstingur, hægur hjartsláttur, hjartslátttruflanir og hjartastopp geta komið fram við háa blóðþéttni lyfsins.

Áður en áhrifa á hjarta og æðakerfi verður vart koma venjulega fyrst fram eiturvekanir á miðtaugakerfi, nema sjúklingurinn sé í svæfingu eða sé mjög slævður af völdum lyfja eins og benzodíazepíns eða barbitúrats.

Einnig skal reikna með altækum aukaverkunum adrenalíns þegar ofskömmtnun á sér stað: Áhrif á hjarta og æðakerfi eins og t.d. hitatilfinning, svitamyndun, hjartsláttur, höfuðverkur sem líkist mígreni, blóðþrýstingshækkun, hjartaöng, hraðtaktur, hraðsláttarglöp og hjartastopp. Truflun getur orðið á klínískri mynd einkenna þar sem ólíkir fylgikvillar og aukaverkanir geta komið fram samtímis.

Meðferð á bráðum eitrunum

Ef einkenni bráðrar eitrunar koma fram skal samstundis stöðva gjöf staðdeyfilyfs.

Ef krampar koma fram er markmið meðferðarinnar að viðhalda öndun og súrefnismettun og styðja við blóðrásarkerfið. Gefa á súrefni og veita öndunarhjálp ef þörf krefur (gríma og poki eða barkaslanga). Ef krampar hætta ekki sjálfkrafa innan 15-20 sek. er krampalosandi lyf gefið í bláæð til þess að stuðla að nægjanlegri öndun og súrefnismettun. Þíópentálnatríum 1-3 mg/kg í bláæð er fyrsta val. Í staðinn má gefa díazepam 0,1 mg/kg líkamspunga í bláæð, en verkun þess hefst eftir lengri tíma. Langvarandi krampar geta stofnað öndun og súrefnismettun sjúklings í hættu. Við slíkar aðstæður auðveldar inndæling vöðvaslakandi lyfs (t.d. suxametón 1 mg/kg líkamspunga) öndun og hægt er að stjórna súrefnismettun. Í slíkum tilvikum skal hafa í huga að koma barkaslöngu fyrir snemma. Ef bæling hjarta og æðakerfis er greinileg (lágþrýstingur, hægsláttur), skal gefa 5-10 mg af efedríni í bláæð og endurtaka eftir 2-3 mín. ef þörf krefur.

Við hjartastopp skal hefja endurlífgun strax. Stöðug fullnægjandi súrefnismettun og öndunarhjálp ásamt stuðningi við blóðrásarkerfi sem og leiðrétting á blóðsýring er lífsnauðsynleg.

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is.

4.9 Ofskömmun

Við gjöf lyfsins fyrir slysi í æð sjást eiturverkanir innan 1-3 mín. Við ofskömmun geta liðið 20-30 mín. áður en einkenni ofskömmunar koma fram, háð stungustað. Eiturverkanir koma aðallega fram í miðtaugakerfi og hjarta og æðakerfi.

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Staðeyfilyf, mepivacainum í blöndum, ATC-flokkur: N01BB53.

Mepivacainhýdróklóríð er staðeyfilyf af flokki amíða. Verkun þess hefst fljótt og verkunarlengd er í meðallagi löng. Virkni þess er svipuð og virkni lídókaíns. Verkun 2% lausnar varir í allt að 5 klst. Þegar það er gefið til leiðsludeyfingar á útlægum taugum. Þegar styrkleikinn 1% er notaður, verða áhrif á hreyfitaugaþræði minni og verkunartími er styttri.

Upphaf verkunar og verkunarlengd mepivacains er háð skammtinum og íkomustaðnum.

Ef adrenalín er gefið með eykur það verkunarlengd við íferðardeyfingu og deyfingu útlægra tauga.

Mepivacain veldur, eins og önnur staðeyfilyf, tímabundinni hömlun á útbreiðslu taugaboða eftir taugaþráðum með því að koma í veg fyrir innflæði natríumjóna gegnum frumuhimnur taugaþráða. Talið er að staðeyfilyf af flokki amíða verki á natríumgöng taugahimna.

Staðeyfilyf geta einnig haft svipuð áhrif á aðrar ertanlegar himnur í heila og hjartavöðva. Ef of mikið af lyfinu berst út í blóðrásina, fer að bera á einkennum ofskömmunar sem eiga aðallega upptök sín í miðtaugakerfi og hjarta og æðakerfi.

Einkenni frá miðtaugakerfi koma venjulega fram á undan einkennum frá hjarta og æðakerfi þar sem þau koma fram við lægri þéttni. Bein áhrif staðeyfilyfja á hjarta eru meðal annars hæg leiðni, minnkaður samdráttarkraftur og að lokum hjartastopp.

5.2 Lyfjahvörf

Mepivacain hefur pKa 7,8 og olíu/vatns hlutfallsstuðull er 0,8.

Frásogshraði er háður skammti, íkomuleið og háráðþéttni á stungustað. Hámarksþéttni næst á 15-20 mín. Dreifingarrúmmál við jafnvægi er 84 lítrar. Mepivacain er 78% bundið próteinum í plasma, aðallega við alfa-1-sýru glýkóprótein.

Úthreinsun mepivacains er nánast eingöngu vegna umbrots í lifur og er háð blóðflæði um lifur og virkni umbrotsensíma. Heildarplasmaúthreinsun mepivacains er 0,8 l/mín., lokahelmingunartími brotthvarfs er 1,9 klst og útskilnaðarhlutfall lifrar er 0,5.

Lokahelmingunartími brotthvarfs hjá nýburum er um þrisvar sinnum lengri en hjá fullorðnum.

Mepivacain berst yfir fylgju og jafnvægi kemst fljótt á milli þéttni óbundins mepivacains í plasma hjá móður og fóstri. Hlutfall plasmapróteinbindingar hjá fóstri er minna en hjá móður, sem veldur lægri heildarplasmaþéttni hjá fóstroinu.

Mepivacain berst í brjóstamjólki, en í svo litlum mæli að lítil hætta er á að það hafi áhrif á barnið.

Einungis um 4% af mepivacaini skilst út á óbreyttu formi. Umbrot lyfsins er með hýdroxýltengingu eða samtengingu, en aðeins 30% af inndældu lyfi hefur fundist á formi umbrotsefna.

Aðal umbrotsefni mepivacains eru 3-OH-afleiðan (16%), 4-OH-afleiðan (12%) og N-metýlsvipta

afleiðan PPX (2,5%). Plasmabéttni virka umbrotsefnisins PPX er minni en 0,1% af móðurlýfinu.

Börn

Lokahelmingunartími hjá nýburum er 3 sinnum lengri en hjá fullorðnum sem að hluta til er af völdum dreifingar. Úthreinsun mepivacains er áætluð 5,1-19 ml/mín./kg hjá fullorðnum og 2,9-8,9 ml/mín./kg hjá nýburum, og dreifingarrúmmálið 0,6-1,5 l/kg hjá fullorðnum og 1,2-2,8 l/kg hjá nýburum.

Skert nýrnastarfsemi

Skert nýrnastarfsemi hefur lítil eða engin áhrif á þol fyrir mepivacaini þegar það er notað í stuttan tíma sem deyfing fyrir skurðaðgerðir. Plasmabéttni mepivacains var mæld eftir deyfingu í armflækju við hólhönd með mepivacaini án adrenalíns (600 mg fyrir deyfingu og 50 mg til viðbótar) hjá 8 sjúklingum með langvarandi nýrnabilun á lokastigi.

Miðgildi heildarbéttni í plasma, sem míkrog/ml, og lágildi og hágildi, voru: 1,69 (1,23-7,78) eftir 5 mínútur, 5,61 (4,36-8,19) eftir 30 mínútur, 8,28 (3,83-11,21) eftir 60 mínútur, 7,93 (5,63-11,1) eftir 90 mínútur og 6,49 (5,56-8,35) eftir 150 mínútur. Engin merki um eiturvekun komu fram. Til samanburðar var meðalgildi heildarbéttni í plasma 3,33 míkrog/ml og hæsta staka gildi var 5,21 míkrog/ml hjá sjúklingum með óskerta nýrnastarfsemi sem fengu 600 mg af mepivacaini sem deyfingu í armflækju við hólhönd.

Möguleg skýring á hærri plasmabéttni er að hjá sjúklingum með langvarandi nýrnabilun er þéttni orosmucoïds (AAG) hærri og því eykst próteinbindingin og heildarbéttni einnig, þó er ekki víst að þéttni mepivacains á lyfjafræðilega virku óbundnu formi aukist að því marki að eiturvekanir komi fram.

Úthreinsun umbrotsefnisins PPX um nýru er marktækt tengd úthreinsun kreatíníns. Skortur á fylgni milli heildarútsætningar, sem AUC, og kreatínínúthreinsunar gefur til kynna að heildarúthreinsun PPX feli í sér brotthvarf annars staðar í líkamanum fyrir utan útskilnað um nýru. Útsætning fyrir PPX getur aukist hjá sumum sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi vegna lítillar úthreinsunar annars staðar en um nýru. Vegna minni eiturvekana PPX á miðtaugakerfið samanborið við mepivacain eru klínískar afleiðingar taldar hverfandi þegar meðferðartími er stuttur.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Í dýrarannsóknum tengdust einkenni eitrunar, sem fram komu eftir stóra skammta af mepivacaini, áhrifum á miðtaugakerfið og hjarta og æðakerfið. Engar aukaverkanir tengdar lyfinu hafa sést í rannsóknum á eiturvekun á æxlun. Hugsanleg stökkbreytandi áhrif hafa ekki verið rannsökuð. Krabbameinsrannsóknir hafa ekki verið gerðar á mepivacaini, vegna verkunarstaðs og verkunarlangdar við lækningalega notkun þessa lyfs.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Hýdrógenklóríð (til að stilla pH 3,3-5,0), natríumklóríð, natríumhýdroxíð (til að stilla pH 3,3-5,0), natríummetabísúlfít, metýlparahýdroxýbenzóat (E218), vatn fyrir stungulyf.

6.2 Ósamrýmanleiki

Carbocain adrenalín stungulyf er sæfð, jafnþrýstin vatnslausn með pH 3,3-5,0. Lausnin inniheldur andoxunarefnið natríummetabísúlfít.

Leysni mepivacains takmarkast við pH>6,5. Þetta verður að hafa í huga þegar basískum lausnum (t.d. karbónötum) er bætt við þar sem útfelling getur orðið. Blöndun basískra lausna við Carbocain adrenalín getur valdið hröðu niðurbroti adrenalíns.

Vegna óstöðugleika adrenalíns má ekki sæfa lausnir sem innihalda adrenalín með hita.

Koma skal í veg fyrir langvarandi snertingu lausna sem innihalda adrenalín (lágt sýrustig) og málmyfirborðs (sprautunálar), þar sem uppleystar málmjónir, sérstaklega koparjónir, geta valdið alvarlegri staðbundinni ertingu með bjúgmyndun á stungustað og hraðað niðurbroti adrenalíns.

6.3 Geymsluþol

2 ár.

Má ekki nota lengur en í þrjá daga eftir að umbúðir hafa verið rofnar.

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Má ekki frjósa.

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn ljósi.

Geymið við 2°C - 15°C.

6.5 Gerð íláts og innihald

Hettuglös.

Pakkningastærð:

5 x 20 ml.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Notkun eftir að umbúðir hafa verið rofnar:

Hætta er á örverumengun í fjölskammta umbúðum (hettuglösum). Ef fjölskammta hettuglös eru notuð skal fylgja eftirfarandi varúðarreglum:

- Nota skal einnota sæfð áhöld við lyfjagjöf.
- Nota skal sæfða nál og sprautu í hvert skipti sem dregið er upp úr hettuglasi.
- Útiloka skal að mengandi efni eða vökvi berist inn í fjölskammta hettuglös.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Aspen Pharma Trading Limited
3016 Lake Drive, Citywest Business Campus,
Dublin 24, Írland

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

MTnr 719001 (IS).

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis: 15. júlí 1971

Nýjasta dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 8. janúar 2009.

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

30. nóvember 2017