

SAMANTEKT Á EIGINLEIKUM LYFS

1. HEITI LYFS

Sendoxan 200 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn
Sendoxan 500 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn
Sendoxan 1 g (1.000 mg) stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn
Sendoxan 2 g (2.000 mg) stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

2. INNIHALDSLÝSING

Sendoxan 200 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Hvert hettuglas inniheldur: cýklófosfamíðeinhýdrat sem jafngildir 200 mg af cýklófosfamíði.

Sendoxan 500 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Hvert hettuglas inniheldur: cýklófosfamíðeinhýdrat sem jafngildir 500 mg af cýklófosfamíði.

Sendoxan 1 g (1.000 mg) stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Hvert hettuglas inniheldur: cýklófosfamíðeinhýdrat sem jafngildir 1.000 mg af cýklófosfamíði.

Sendoxan 2 g (2.000 mg) stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Hvert hettuglas inniheldur: cýklófosfamíðeinhýdrat sem jafngildir 2.000 mg af cýklófosfamíði.

Sjá lista yfir öll hjálparefni í kafla 6.1.

3. LYFJAFORM

Stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn.

Hvítt duft.

Eftir blöndun: tær lausn.

4. KLÍNÍSKAR UPPLÝSINGAR

4.1 Ábendingar

Non-Hodgkins eitlaæxli. Hodgkins sjúkdómur. Langvinnt eitilfrumuhvítblæði, brátt hvítblæði.

Mýelómatoxis (mergæxli), makróglóbúlínaemia (risaglóbulíndreyri).

Krabbamein í eggjastokkum, krabbamein í brjóstum, smáfrumu lungnakrabbamein, nevróblastóm (taugakímfrumuæxli), seminóm (sæðiskrabbamein).

Sem ónæmisbælandi meðferð við Wegeners-granulomatósu, Goodpastures heilkenni og segavarnarefni í blóði (faktorVIII mótefni). Í sjaldgæfum tilvikum við m.a. iktsýki, nýruna heilkenni, rauðum úlfum, ónæmistengdu blóðlýsublóðleysi (hemolytic anemia autoimmune) og ofnæmistengdri blóðflagnafæð (thrombocytopenic purpura) af óþekktri orsök.

4.2 Skammtar og lyfjagjöf

Meðhöndlun með Sendoxan verður að vera undir stjórn læknis með reynslu af notkun lyfsins.

Í upphafi er cýklófosfamíð yfirleitt gefið í bláæð.

Skammtar

Skömmtun þarf að ákveða með tilliti til þarfa hvers sjúklings.

Skammtastærð, meðferðarlengd og/eða meðferðarlotur ráðast af ábendingum, skammtaáætlun í samsettri meðferð, almennu heilsufari og líkamsstarfsemi sjúklings og rannsóknaniðurstöðum (einkum varðandi blóðfrumur).

Meðferð má aðgreina í mismunandi tegundir:

1) *Dagleg meðferð með lágum skömmtum*: 2-6 mg/kg líkamsþyngdar í bláæð daglega, samsvarandi 120-240 mg/m². Meðferðin heldur áfram þar til að tilætluðum árangri er náð, eða þar til fjöldi hvíttra blóðkorna er kominn undir $2 \times 10^9/l$, þá er gert hlé í 3-5 daga. Þegar hvít blóðkorn hafa náð $3-4 \times 10^9/l$ skal hefja meðferð aftur.

2) *Viðhaldsmeðferð með meðalháum skömmtum*: 10-15 mg/kg samsvarandi 400-600 mg/m², í bláæð vikulega. Þegar fjöldi hvíttra blóðkorna er kominn undir $2 \times 10^9/l$ skal lengja tímann á milli gjafa þar til hann hefur náð $3-4 \times 10^9/l$.

3) *Viðhaldsmeðferð með háum skömmtum*: 20-40 mg/kg samsvarandi 800-1.600 mg/m² gefið í bláæð á 10-20 daga fresti. Tímalengd milli meðferða ræðst af fjölda hvíttra blóðkorna. Þegar fjöldinn er kominn í $3-4 \times 10^9/l$, skal hefja næstu meðferð.

4) *Viðhaldsmeðferð með mjög háum skömmtum*: 60-80 mg/kg samsvarandi 2.400-3.200 mg/m² í bláæð á 3-4 vikna fresti. Þessi skömmtun lyfsins er einkum notuð við líffæraæxlum (solid æxlum). Ríkuleg vökvagjöf jafnvel í æð, til að minnka hættu á blæðandi blöðrubólgu er ráðlögð (sjá 4.8 Aukaverkanir).

Börn: Þeir skammtar sem mælt er með í mg/kg líkamsþyngdar gilda líka fyrir börn t.d. eins og í 1) hér að ofan.

Ónæmisbælandi meðferð:

Fullorðnir: Venjulega eru notaðir skammtar 100-200 mg/dag.

Börn: U.þ.b. 3 mg/kg líkamsþyngdar.

Meðferðareftirlit:

Eftirfarandi atriðum skal fylgjast með reglulega:

Hvít blóðkorn. Í byrjun meðferðar rannsökuð 3.-7. hvern dag, við langtíma meðhöndlun og stöðuga blóðmynd e.t.v. aðra hverja viku. Ávallt verður að kanna blóðhag fyrir hverja viðhaldsmeðferð.

Þvagefni.

Sykurbúskap hjá sykursjúkum.

Skert nýrna- og lifrarstarfsemi fyrir meðhöndlun þarfnast einnig reglulegs eftirlits.

Ef blóð sést í þvagi verður að hætta meðferð. Meðan á lyfjagjöf stendur eða strax á eftir, skal draga úr hættu á blöðrubólgu og eitúrhritum á þvagrás með því að gefa nægilegan vökva með inntöku eða innrennsli, jafnvel með þvagræsilyfjum, til að örva þvagmyndun. Koma má í veg fyrir blöðrubólgu með því að gefa mesna samtímis (sjá kafla 4.4).

Lyfjagjöf í æð

Æskilegast er að gefa lyfið sem innrennsli í bláæð.

Til að draga úr líkum á aukaverkunum sem virðast tengjast hraða lyfjagjafar (t.d. þrota í andliti, höfuðverk, nefstíflu, sviða í hársverði) ætti að gefa cýklófosfamíð með mjög hægri inndælingu eða innrennsli.

Skert nýrnastarfsemi

Þörf getur verið á aðlögun skammta hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi (sjá kafla 4.4)

Hægt er að fjarlægja cýklófosfamíð og umbrotsefni þess með skilun, þó úthreinsun geti verið mismunandi eftir því hvaða skilunaraðferð er notuð.

Skert lifrarstarfsemi

Þörf getur verið á aðlögun skammta hjá sjúklingum með skerta lifrarstarfsemi (sjá kafla 4.4).

4.3 Frábendingar

- Þekkt ofnæmi fyrir cýklófosfamíð.
- Mjög skert beinmergsstarfsemi (einkum hjá þeim sjúklingum sem áður hafa verið í krabbameinslyfjameðferð og/eða geislameðferð).
- Blöðrubólga.
- Virkar sýkingar.
- Teppa í neðri hluta þvagfæra.
- Stöðva skal brjóstagið meðan á meðferð með cýklófosfamíði stendur.

4.4 Sérstök varnaðarorð og varúðarreglur við notkun

Bæði karlar og konur verða að nota örugga getnaðarvörn meðan á meðferð stendur og í a.m.k. 6-12 mánuði eftir að henni lýkur.

Gæta skal varúðar hjá sjúklingum sem hafa gulu eða útbreidd meinvörp í beinum, fá samtímis geislameðferð, hafa verulega skerta nýrnastarfsemi eða lifrastarfsemi, sögu um hjartasjúkdóm, beinkröm eða beinmergsmein (kynningafæð, mergæxli).

Varnaðarorð

Mergbæling, ónæmisbæling, sýkingar

- Ónæmisbælandi áhrif cýklófosfamíðs geta dregið út áhrifum bólusetningar. Notkun lifandi bóluefna getur valdið sýkingu af völdum bóluefnisins.
- Ekki ætti að gefa sjúklingum cýklófosfamíð sem eru með hvítfrumnafjölda undir $2 \times 10^9/l$ og/eða blóðflagnafjölda undir $50 \times 10^9/l$.

Eituráhrif á þvagrás og nýru

- Áður en meðferð er hafin þarf að útiloka eða lagfæra hugsanlega þrengingu í þvagleiðurum. Sjá kafla 4.3
- Viðeigandi meðferð með mesna og/eða mikil vökvagjöf til að örva þvagmyndun getur dregið verulega úr eituráhrifum á þvagblöðru. Mikilvægt er að tryggja að sjúklingar tæmi blöðruna reglulega.
- Fyrri eða samtímis geislun eða meðferð með búsúlfani getur aukið hættu á blæðandi blöðrubólgu af völdum cýklófosfamíðs.
- Eituráhrif á þvagfæri geta komið fram eftir skammtíma eða langtíma notkun cýklófosfamíðs. Tilkynnt hefur verið um blæðandi blöðrubólgu eftir staka skammta af cýklófosfamíði.
- Tilkynnt hefur verið um blæðandi blöðrubólgu, nýrnaskjóðubólgu, þvagleiðarabólgu og blóðmigu í tengslum við meðferð með cýklófosfamíði. Sár, drep, bandvefsmyndun, herpingur og afleidd æxli geta komið fram í þvagblöðru.
- Tilkynnt hefur verið um lækkaðan styrk natríums í blóði vegna aukins vatnsmagns í líkamanum, bráða vatnseitrun og einkenni sem líkjast heilkenni ónógrar ADH-seytingar (SIADH; syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone) í tengslum við meðferð með cýklófosfamíði. Tilkynnt hefur verið um dauðsföll af þessum ástæðum. Ráðlagt er að viðhafa mikla varúð við samtímis meðferð með indómetasíni því eitt tilfelli af alvarlegri bráðri vatnseitrun hefur verið tilkynnt.

Eituráhrif á hjarta, notkun hjá hjartasjúklingum

- Hætta á eituráhrifum á hjarta getur verið aukin t.d. eftir stóra skammta af cýklófosfamíði, hjá öldruðum sjúklingum og hjá sjúklingum sem áður hafa fengið geislameðferð á hjartasvæði og/eða hafa áður fengið eða fá samtímis meðferð með öðrum lyfjum sem hafa eituráhrif á hjarta.
- Tilkynnt hefur verið um bráð eituráhrif á hjarta við stakan skammt af undir 20 mg/kg af cýklófosfamíði.
- Tilkynnt hefur verið um hjartavöðvabólgu og gollurshúsbólgu, sem geta tengst verulegu útlæði í gollurshús og hjartaþrengingu, í tengslum við meðferð með cýklófosfamíði og hefur þetta leitt til alvarlegrar hjartabilunar, stundum banvænnar.
- Tilkynnt hefur verið um ofanslegilssláttarglöp (supraventricular arrhythmias) og sleglasláttarglöp (ventricular arrhythmias) eftir meðferð sem innihélt cýklófosfamíð hjá sjúklingum með og án annarra einkenna eituráhrifa á hjarta.

Eituráhrif á lungu

Tilkynnt hefur verið um lungnabólgu og bandvefsmyndun í lungum meðan á meðferð með cýklófosfamíði stendur og eftir meðferð. Lungnabólga getur komið fram jafnvel einhverjum árum eftir meðferð með cýklófosfamíði. Tilkynnt hefur verið um brád eituráhrif á lungu eftir stakan skammt af cýklófosfamíði. Einnig hefur verið tilkynnt um lungnabláæðateppusjúkdóm og önnur eituráhrif á lungu.

Afleidd æxli

- Aukin hætta er á krabbameini í þvagleiðurum, eitilfrumukrabbameini, skjaldkirtilskrabbameini, sarkmeini og öðrum æxlum. Einnig er aukin hætta á mergmisþroskun, sem getur þróast yfir í bráðahvítblæði.
- Draga má verulega úr hættu á krabbameini í þvagblöðru með því að fyrirbyggja blæðandi blöðrubólgu.

Lifrarbláæðateppusjúkdómur

- Tilkynnt hefur verið um lifrarbláæðateppusjúkdóm hjá sjúklingum sem fá cýklófosfamíð. Frumueyðandi meðferð til undirbúnings beinmergsígræðslu, sem samanstendur af cýklófosfamíði ásamt geislun á allan líkamann, búsuþfani eða öðrum lyfjum, hefur reynst vera megináhættuþáttur fyrir myndun lifrarbláæðateppusjúkdóms (sjá kafla 4.5). Klínísk einkenni koma yfirleitt fram 1 til 2 vikum eftir ígræðslu. Einnig hefur verið tilkynnt um að lifrarbláæðateppusjúkdómur komi smám saman fram hjá sjúklingum sem fá langtíma og lágskammta meðferð með cýklófosfamíði til ónæmisbælingar. Tilkynnt hefur verið um dauðsföll af völdum lifrarbláæðateppusjúkdóms sem tengist meðferð með cýklófosfamíði.
- Meðal áhættuþátta sem auka líkur á lifrarbláæðateppusjúkdómi hjá sjúklingum sem fá háskammta frumueyðandi meðferð eru
 - truflanir á lifrarstarfsemi sem voru fyrir
 - fyrri geislameðferð á kviðarholi
 - lágt færnistig á Karnofsky kvarða.

Bráðaofnæmisviðbrögð, krossverkun við önnur alkýlerandi efni

- Tilkynnt hefur verið um bráðaofnæmisviðbrögð, sem m.a. hafa leitt til dauðsfalla, í tengslum við notkun cýklófosfamíðs.
- Hugsanleg krossverkun við önnur alkýlerandi efni hefur verið tilkynnt.

Röskun á græðingu sára

- Cýklófosfamíð getur haft áhrif á eðlilega græðingu sára.

Varúðarreglur

Áfengisneysla

Neysla alkóhóls getur aukið ógleði og uppköst af völdum cýklófosfamíðs.

Gjöf utan æðar

Frumuhemjandi verkun cýklófosfamíðs kemur fram eftir virkjun þess, sem verður einkum í lifur. Því er hætta á vefjaskemmdum vegna gjafar lyfsins utan æðar fyrir slysi lítil.

Sé lyfið gefið utan æðar fyrir slysi ber að stöðva innrennsli tafarlaust, draga cýklófosfamíðlausnina sem lenti utan æðar upp á ný án þess að hreyfa nálina og grípa til annarra ráðstafana sem kunna að vera viðeigandi.

Skert nýrnastarfsemi

Hjá sjúklingum með skerta nýrnastarfsemi, einkum alvarlega skerta nýrnastarfsemi, getur minnkaður útskilnaður í nýrum leitt til aukinnar plasmabéttni cýklófosfamíðs og umbrotsefna þess. Þetta getur leitt til aukinna eituráhrifa og ber að hafa í huga við ákvörðun skammtastærðar.

Skert lifrarstarfsemi

Alvarleg skerðing á lifrarstarfsemi getur tengst minnkaðri virkjun cýklófosfamíðs. Þetta getur breytt virkni cýklófosfamíð meðferðarinnar og ber að hafa í huga við ákvörðun skammtastærðar og túlkun viðbragða við völdum skammti.

4.5 Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir

Milliverkanir sem hafa áhrif á lyfjahlvörf cýklófosfamíðs og umbrotsefna þess

Cýklófosfamíð er virkjað og umbrotið af CYP450. Samtímis meðhöndlun annarra efna sem auka eða hemja CYP450 geta einnig leitt til milliverkana.

Minnguð virkjun cýklófosfamíðs getur breytt virkni meðferðar með cýklófosfamíði. Meðal efna sem seinka virkjun cýklófosfamíðs eru: Amiodarón, aprepitant, búprópíón, búsulfan, cíprófloxacín, flúkónazól, ítrakónazól, ketókónazól, klaritrómycín, posakónazól, prasugrel, súlfónamíð, telitrómycín, tiotepa, vorikónazól.

Þéttni frumudrepandi umbrotsefna getur aukist með efnum sem virkja frymisagnaensím (microsomal enzymes) í lifur eða öðrum vefjum (t.d. CYP450). Dæmi um slík virkjandi efni eru rífampicín, fenóbarbítal, karbamazepín, fenýtóín, Jóhannesarrunni og barksterar. Íhuga þarf hugsanlega virkjun CYP 450 ef efni sem vitað er að örva virkni slíkra ensíma eru notuð samtímis eða strax á undan cýklófosfamíði.

Eftirtalin efni geta einnig aukið þéttni frumudrepandi umbrotsefna, hugsanlega með því að hemja umbrot eða draga úr útskilnaði um nýru: Allópúrinól, cimetidín, hýdroklórtíazið.

HIV-Próteasahemlar: Samtímis notkun próteasahemla getur aukið þéttni frumudrepandi umbrotsefna. Sýnt hefur verið að tíðni sýkinga og dauðfyrningafæðar hjá sjúklingum sem fengu cýklófosfamíð, doxórúbisín og etopósíð (CDE) var hærri ef þeir fengu að auki lyfjameðferð sem byggist á próteasahemlum en ef þeir fengu meðferð sem byggist á bakritahemlum, sem ekki eru núkleósíð (NNRTI).

Milliverkanir sem hafa áhrif á lyfjahlvörf annarra lyfja

Cyclosporín: Lægri sermispéttni cyclosporíns hefur sést hjá sjúklingum sem fá cýklófosfamíð ásamt cyclosporíni en sjúklingum sem fá aðeins cyclosporín. Þessi milliverkun getur valdið aukinni tíðni hýsilhöfnunar.

Dígoxín, β-acetyldígoxín: Tilkynnt hefur verið að meðferð með frumudrepandi efnum, að meðtöldu cýklófosfamíði, skerði frásog dígoxín og β-dígoxín taflna í þörmum.

Verapamíl: Tilkynnt hefur verið að meðferð með frumudrepandi efnum, að meðtöldu cýklófosfamíði, skerði frásog verapamíls í þörmum.

Milliverkanir á lyfhrif (sjá ennfremur kafla 4.8)

Tilkynnt hefur verið um bæði aukningu og minnkun áhrifa warfaríns hjá sjúklingum sem fá warfarín ásamt cýklófosfamíði.

Tilkynnt hefur verið um lengda hindrun taugaboða til vöðva hjá sjúklingum við samtímis notkun afskautandi vöðvaslakandi efna (t.d. suxameton). Forðast skal að nota þessi lyf samtímis cýklófosfamíði.

- Forðast skal notkun lifandi bóluefna hjá ónæmisbældum einstaklingum, þar sem slíkt getur valdið sýkingu af völdum þeirra.

Eftirfarandi lyf geta aukið eituráhrif cýklófosfamíðs: Antracyklín, cytarabín, trastuzumab (eituráhrif á hjarta), ACE-hemlar, natalizumab, paklitaxel, zidovudín (eituráhrif á blóðmynd), azatioprín (eituráhrif á lifur), amfotericin B (eituráhrif á nýru), amiodarón, G-CSF, GM-CSF (eituráhrif á lungu), tamoxifen (áhrif á segarek).

Geislun á svæðið umhverfis hjartað getur aukið hættuna á eituráhrifum cýklófosfamíðs á hjarta.

4.6 Frjósemi, meðganga og brjóstgjöf

Frjósemi

Cýklófosfamíð hefur áhrif á myndun eggfrumna og sæðisfrumna og getur valdið ófrjósemi hjá báðum kynjum, sem getur verið óafturkræft hjá sumum sjúklingum.

Cýklófosfamíð hefur eituráhrif á erfðaeefni og er krabbameinsvaldandi, bæði í líkamsfrumum og kynfrumum karla og kvenna. Konur ættu því ekki að verða þungaðar eða karlar að geta börn meðan á meðferð með cýklófosfamíði standur.

Konur og karlar á frjósemisaldri skulu nota virka getnaðarvörn meðan á meðferð standur og að lágmarki 6-12 mánuðum eftir lok meðferðar.

Kvenkyns sjúklingar:

- Tíðateppa
- Fátíðir (oligomenorrhea)
- Stúlkur sem fá cýklófosfamíð og hafa óskerta virkni eggjastokka eftir að meðferð lýkur eru í aukinni hættu á ótímabærum tíðahvörfum.

Karlkyns sjúklingar:

- Fækkun sæðisfrumna
- Geldsæði (afturkræft hjá sumum sjúklingum, þó það gerist stundum ekki fyrr en nokkrum árum eftir lok meðferðar).
- Vart getur orðið við nokkra visnun á eistum.
- Drengir sem fá cýklófosfamíð fyrir kynþroskaaldur geta þroskað kyneinkenni á eðlilegan hátt en þó getur komið fram hjá þeim fækkun sæðisfrumna eða geldsæði.

Meðganga

Ef cýklófosfamíð er gefið á meðgöngu getur það valdið fósturláti, eituráhrifum á fóstur, fósturdauða eða vansköpun. Á meðgöngu, einkum á fyrsta þriðjungi meðgöngu, skal eingöngu gefa frumueyðandi lyf eftir ábendingum og vega síðan þörf móðurinnar á móti áhættunni fyrir fóstrið.

Brjóstgjöf:

Cýklófosfamíð berst yfir í brjóstamjólk í það miklu magni að hætta er á verkun á fóstrið jafnvel í venjulegum skömmtum. Hætta skal brjóstgjöf meðan á meðferð með Sendoxan standur (sjá kafla 4.3 Frábendingar).

4.7 Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla

Sjúklingar sem fá meðferð með cýklófosfamíði geta fundið fyrir aukaverkunum (t.d. svima, þokusjón og sjóntruflunum) sem geta haft áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Meta þarf í hverju tilfelli fyrir sig hvort rétt sé að sinna akstri eða notkun véla.

4.8 Aukaverkanir

Upptalning aukaverkana af völdum cýklófosfamíðs í þessu skjali er byggð á reynslu eftir markaðssetningu lyfsins (sjá hér að neðan).

Þær aukaverkanir sem oftast hafa verið tilkynntar eftir markaðssetningu lyfsins eru: hvítfrumnafæð, hárlós, ógleði, uppköst og niðurgangur.

Tíðni aukaverkana er skilgreind sem hér segir: Mjög algengar ($\geq 1/10$); algengar ($\geq 1/100$ til $< 1/10$); sjaldgæfar ($\geq 1/1.000$ til $< 1/100$); mjög sjaldgæfar ($\geq 1/10.000$ til $< 1/1.000$); koma örsjaldan fyrir ($< 1/10.000$), tíðni ekki þekkt (ekki hægt að áætla út frá fyrirbyggjandi gögnum).

Aukaverkanir		
Flokkun eftir líffærum	Skilgreiningar skv. MedDRA	Tíðni
Sýkingar af völdum sýkla og sníkjudýra	Blóðsýking* þ.m.t. blóðsýkingarlost* Lungnabólga* Sýkingar**	Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Æxli, góðkynja og illkynja (einnig blöðrur og separ)	Afleidd æxli (secondary tumors) **** Mergmisþroskun Hvítblæði Krabbamein í þvagblöðru Krabbamein í skjaldkirtli Sarkmein Eitilfrumukrabbamein sem er ekki af Hodgkins-gerð Krabbamein í þvagleiðara Nýrnafrumukrabbamein Nýrnaskjóðuæxli Krabbameinsvaldandi áhrif á afkvæmi Æxlislýsuheilkenni	Mjög sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Blóð og eitlar	Mergbæling (staðfest sem beinmergsbrestur) Hvítfrumnafæð (sem getur leitt til afleiddrar sýkingar og hita) Blóðflagnafæð***** Blóðleysi Daufkyrningafæð Kyrningahrap Blóðfrumnafæð Eitilfrumnafæð Blóðstorkusótt (DIC) Blóðlýsupvageitrunarheilkenni (með blóðsega í smáæðum)	Tíðni ekki þekkt Algengar Algengar Algengar Algengar Mjög sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Ónæmiskerfi	Bráðaofnæmislost Bráðaofnæmisviðbrögð Ónæmisbæling Ofnæmisviðbrögð	Koma örsjaldan fyrir Koma örsjaldan fyrir Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Innkirtlar	Heilkenni ónógrar ADH-seytingar (SIADH) Vatnseitrun	Mjög sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt
Efnaskipti og næring	Lækkað natríum í blóði Vökvasöfnun Lystarleysi Breytingar á glúkósa í blóði (hækkun, lækkun)	Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt
Geðræn vandamál	Rugl	Tíðni ekki þekkt
Taugakerfi	Svimi Heilakvilli Krampi Eituráhrif á taugar Afturkræfur aftari hvítuheilakvilli Mænukvilli Úttaugakvilli, Fjöлтаugakvilli Taugaverkir Tilfinningartruflun, minnkað snertiskyn, náladofi Skjálfti Bragðtruflun, vanbragð	Mjög sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt

Aukaverkanir		
Flokkun eftir líffærum	Skilgreiningar skv. MedDRA	Tíðni
	Óþægindi í nefi Nefrennsli Hnerri Verkur í munnkoki	Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Meltingarfæri	Ógleði Uppköst Niðurgangur Hægðatregða Kviðverkir Blæðandi ristilbólga Slímbólga Bráð brisbólga Sár á munnslímhúð Blæðing frá meltingarvegi Ristilbólga Garnabólga Botnlangabólga Vangakirtilsbólga Óþægindi í kvið	Algengar Algengar Algengar Algengar Algengar Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Lifur og gall	Óeðlileg lifrarstarfsemi Lifrarbláæðateppusjúkdómur Lifrabólga Gallteppulifrabólga Frumueyðandi lifrabólga Gallteppa Lifrareitrun með lifrabilun Lifrarheilakvilli Skinuholsvökvi Lifrarstækkun Gula Hækkaður gallrauði í blóði Hækkun á lifrarensímum (aspartat amínótransferasi, alanín amínótransferasi, alkalískur fosfatasi gamma-glútamýltransferasi)	Algengar Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Húð og undirhúð	Hárlos Útbrot Ofsakláði Breytingar á húð og nöglum (mislitun lófa, nagla og ilja) Eitrunardreplos í húðþekju Stevens-Johnson heilkenni Regnbogaroðasótt Handa-fótaheilkenni Roði á geisluðu svæði („Radiation recall“ húðbólga) Húðbólga Kláði (þ.m.t. bólgukláði) Hörundsroði Blöðrur á húð Þroti í andliti Ofsvitnun	Algengar Algengar Algengar Mjög sjaldgæfar Koma örsjaldan fyrir Koma örsjaldan fyrir Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Stoðkerfi og stoðvefur	Rákvöðvalýsa Herslishúð Krampi	Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt

Aukaverkanir		
Flokkun eftir líffærum	Skilgreiningar skv. MedDRA	Tíðni
	Vöðvaverkir Liðverkir	Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Nýru og þvagfæri	Blæðandi blöðrubólga án sýkingar sést hjá um 10% sjúklinga sem fá háskammta eða langtímameðhöndlun Drep í nýrnápíplum Blæðandi þvagleiðarabólga Herslismyndun í þvagblöðru Óeðlilegar þekjufrumur í þvagblöðru Sár í nýrum Nýrnabilun/skert nýrnastarfsemi Truflun í nýrnápíplum Nýrnaeitrunarkvilli Nýrnaskjóðubólga Drep í þvagblöðru Sárablöðrubólga Herpingur í þvagblöðru Blóðmiga Flóðmiga Hækkað kreatínín í blóði Hækkað þvagefnisnitur í blóði	Algengar Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Meðganga, sængurlega og burðarmál	Ótímabær léttasótt	Tíðni ekki þekkt
Æxlunarfæri og brjóst	Tíðateppa***** Geldsæði/engar sáðfrumur***** Fátíðir (oligomenorrhea) ***** Ófrjósemi Eggjastokkabilun Röskun á egglosi Eistavisnun Fækkun sáðfrumna***** Lækkað estrógen í blóði Hækkað gónadótrópín í blóði	Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Meðfætt og fjölskyldubundið/arfgengt ástand	Fósturdauði í legi Vansköpun fósturs Hömlun fósturvaxtar Eituráhrif á fóstur (að meðtalinni mergbælingu og ristil- og þarmabólgu)	Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt
Almennar aukaverkanir og aukaverkanir á íkomustað	Hiti Höfuðverkur Viðbrögð á stungu/innrennslisstað Bólga Segamyndun Vefjadrep Bláæðabólga Fjöllíffærabilun Almennur lasleiki Inflúensulík einkenni Bjúgur Brjóstverkur Þróttleysi Verkir Kuldahrollur Þreyta	Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Mjög sjaldgæfar Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt

Aukaverkanir		
Flokkun eftir líffærum	Skilgreiningar skv. MedDRA	Tíðni
	Lasleiki	Tíðni ekki þekkt
Rannsóknaniðurstöður	Hækkaður laktat dehydrógenasi í blóði Hækkað C-virkt prótein	Tíðni ekki þekkt Tíðni ekki þekkt

* að meðtöldum dauðsföllum

** að meðtöldum öðrum sýkingum af völdum baktería, sveppa, veira, frumdýra og sníkjudýra; endurvirkjun óvirkra sýkinga, þ.m.t. veirulífrabólga, berklar, JC veira með ágengri, fjölhreiðra innlyksuheilabólgu (þ.m.t. banvæn tilfelli), *Pneumocystis jiroveci*, herpes zoster, *Strongyloides*.

*** að meðtöldu bráðahvítblæði í mergfrumum, bráðu formerglingahvítblæði

**** að meðtalinni versnun undirliggjandi illkynja sjúkdóms (þ.m.t. dauðsföll)

***** viðvarandi

Tilkynning aukaverkana sem grunur er um að tengist lyfinu

Eftir að lyf hefur fengið markaðsleyfi er mikilvægt að tilkynna aukaverkanir sem grunur er um að tengist því. Þannig er hægt að fylgjast stöðugt með sambandinu milli ávinnings og áhættu af notkun lyfsins. Heilbrigðisstarfsmenn eru hvattir til að tilkynna allar aukaverkanir sem grunur er um að tengist lyfinu til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is.

4.9 Ofskömmtn

Einkenni

Meðal alvarlegra afleiðinga ofskömmtnar eru mergbæling, þvageitrun, eituráhrif á hjarta (þ.m.t. hjartabilun), bláæðastíflur í lifur (veno-occlusive hepatic disease) og munnbólga.

Meðferð

Fylgjast þarf vel með sjúklingum sem fá of stóran skammt með tilliti til eituráhrifa, einkum eituráhrifa á blóð.

Mótefni gegn kýklófosfamíði er ekki þekkt.

Kýklófosfamíð og umbrotsefni þess má fjarlægja með skilun. Beita skal blóðskilun eins fljótt og unnt er ef bregðast þarf við ofskömmtn eða eitrun af ásetningi eða slysi.

Ef ofskömmtn verður skal beita stuðningsmeðferð, þ.m.t. bestu fáanlegu viðeigandi meðferð við sýkingum, mergbælingu eða öðrum eituráhrifum, komi þau fram.

Gagnlegt getur verið að beita fyrirbyggjandi meðferð við blöðrubólgu með mesna til að koma í veg fyrir eða takmarka þvageitrun af völdum ofskömmtnar kýklófosfamíðs.

5. LYFJAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

5.1 Lyfhrif

Flokkun eftir verkun: Æxlishefjandi lyf, ATC flokkur: L01AA01.

Kýklófosfamíð er frumuhemjandi lyf, sem tilheyrir oxafosfórínhópnum og er efnafræðilega skýlt köfnunarefnissinnepsgasi. Lyfið er óvirkt forlyf sem fyrir tilstilli cytókrom P450 (CYP) virkjar frumudrepandi eiginleika sína í líkamanum. Aðal umbrotsefnið, 4-hydroxýkýklófosfamíð myndast að mestu í lifur og er í jafnvægi með aldofosfamíð með opna hringbyggingu. Þetta milliefni brotnar stöðugt niður í akrolein og fosfóramíðköfnunarefnissinnepsgas. Það síðarnefnda er talið bindast DNA. Þessi alkýlering veldur brotum og samtengingum DNA þráða og í DNA-prótein þvertengingum. Í frumuhringnum verður seinkun í G2 fasa. Frumudrepandi áhrifin eru ekki sértæk fyrir frumuhringfasann, en eru sértæk fyrir frumuhringinn.

Ekki er hægt að útiloka krossónæmi, sérstaklega fyrir frumuhemjandi lyfjum með svipaða byggingu, eins og ifosfamíði og öðrum alkýlerandi efnum.

Sendoxan hindrar bæði vessa- og frumubundið ónæmi og er því notað til að hindra höfnun við líffæraflutninga. Cýklófosfamíð virkjust með efnahvörfum lifrar og því skal gefa það til inntöku eða með innrennsli í bláæð.

5.2 Lyfjahvörf

Cýklófosfamíð er forlyf sem verður virkt *in vivo* fyrir tilstilli ensímsins cytokrómi P450. Meðal-helmingunartími í plasma er 7 klukkustundir hjá fullorðnum og 4 klukkustundir hjá börnum. Cýklófosfamíð og umbrotsefni þess útskiljast aðallega út um nýrun. Allt að 20% af skammtinum útskilist óbreyttur út með þvagi.

5.3 Forklínískar upplýsingar

Bráð eituráhrif eru lítil, borið saman við önnur krabbameinslyf. Við langvarandi gjöf koma fram lifrarskemmdir hjá tilraunadýrum. Cýklófosfamíð tilheyrir flokki alkýlerandi efna, sem þekkt eru fyrir að valda stökkbreytingum, vansköpun og krabbameini.

6. LYFJAGERÐARFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR

6.1 Hjálparefni

Sendoxan inniheldur engin hjálparefni.

6.2 Ósamrýmanleiki

Enginn þekktur ósamrýmanleiki.

6.3 Geymslupól

3 ár.

Tilbúin lausn geymist í 12 klukkustundir við stofuhita (15 °C-25 °C) eða 24 klukkustundir í kæli (2 °C-8 °C), en vegna hættu á örverumengun ætti að nota það strax eftir að það er tilbúið.

6.4 Sérstakar varúðarreglur við geymslu

Geymið ekki við hærri hita en 25°C.

Ef Sendoxan stungulyfs-/innrennslisstofn lendir í hita hærri en 25 °C við flutning eða geymslu, getur virka efnið cýklófosfamíð bráðnað. Hettuglös þar sem innihaldið hefur bráðnað er auðvelt að aðgreina frá öðrum. Hettuglös með bráðnuðu cýklófosfamíði hafa glæran eða gullitaðan seigfljótandi vökva (sést venjulega í duftinu eða sem smá dropar innan á hliðum hettuglassins). Hettuglös sem innihalda bráðnað efni á ekki að nota.

6.5 Gerð íláts og innihald

Sendoxan 200 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Eitt hettuglas úr glæru gleri pakkað án plastfilmu inniheldur 200 mg af cýklófosfamíði.

Eitt hettuglas úr glæru gleri pakkað með plastfilmu inniheldur 200 mg af cýklófosfamíði.

Pakkning með 1 hettuglasi.

Sendoxan 500 mg stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Eitt hettuglas úr glæru gleri pakkað án plastfilmu inniheldur 500 mg af cýklófosfamíði.

Eitt hettuglas úr glæru gleri pakkað með plastfilmu inniheldur 500 mg af cýklófosfamíði.

Pakkning með 1 hettuglasi.

Sendoxan 1 g (1.000 mg) stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Eitt hettuglas úr glæru gleri pakkað án plastfilmu inniheldur 1.000 mg af cýklófosfamíði.

Eitt hettuglas úr glæru gleri pakkað með plastfilmu inniheldur 1.000 mg af cýklófosfamíði.
Pakkning með 1 hettuglasi.

Sendoxan 2 g (2.000 mg) stungulyfs-/innrennslisstofn, lausn

Eitt hettuglas úr glæru gleri pakkað án plastfilmu inniheldur 2.000 mg af cýklófosfamíði.
Eitt hettuglas úr glæru gleri pakkað með plastfilmu inniheldur 2.000 mg af cýklófosfamíði.
Pakkning með 1 hettuglasi.

Fyrir hettuglas sem eru pakkað með plastfilmu: Ytri hlífðarumbúðir eru í tveimur hlutum: neðri hlutinn er gegnsætt, sívalt hylki úr pólýprópýleni og efri hlutinn er blátt skruflok úr pólýetýleni. Plastfilman er ekki í snertingu við lyfið, en veitir viðbótarvernd í flutningi, sem eykur öryggi heilbrigðisstarfsfólks og annarra sem meðhöndla lyfið.

Ekki er víst að allar pakkningastærðir séu markaðssettar.

6.6 Sérstakar varúðarráðstafanir við förgun og önnur meðhöndlun

Meðhöndlun cýklófosfamíðs á alltaf að vera samkvæmt gildandi reglum um meðhöndlun frumudrepandi efna.

Meðhöndlun og blöndun:

Duftið er leyst upp í jafnþrýstinni natríumklóríðlausn (4-5 ml af lausn fyrir hver 100 mg af efninu, sem gefur lausn með 20 – 25 mg cýklófosfamíð/ml). Þegar vökvanum er sprautað í hettuglasið myndast yfirþrýstingur, sem hægt er að laga með hjálp sæfðrar nálar. Sprautið allri natríumklóríðlausninni í einu í glasið og hristið kröftuglega án hléa þar til allt þurrefnið er uppleyst. Það getur tekið frá nokkrum mínútum til allt að 15 mínútum.

Uppleyst duftið má blanda við natríumklóríðlausn 9 mg/ml, glúkósa- eða frúktósalausnir og Ringer lausn.

Hvernig á að gefa lyfið:

Stungulyfið á að gefa hratt: 20 ml lausn (400-500 mg) í bláæð innan 3-5 mínútna. Stærri skammta má gefa sem stutt innrennsli í um 15-30 mínútur eða að öðrum kosti sem innrennsli í 2-3 klukkustundir.

Þar sem cýklófosfamíð er óvirkt áður en það fer í gegnum lifur, er venjulega engin hættu á vefjaskemmdum lendi stungulyfið utan æðar. Þó er nauðsynlegt komi það fyrir, að stöðva innrennslið, söga upp með innrennslisnálinni, skola svæðið með natríumklóríð lausn og halda útlímnum kyrrum.

7. MARKAÐSLEYFISHAFI

Baxter Medical AB
Box 63
164 94 Kista
Svíþjóð

8. MARKAÐSLEYFISNÚMER

Sendoxan 200 mg/hgl: MTnr. 650708 (IS)
Sendoxan 500 mg/hgl: MTnr. 711396 (IS)
Sendoxan 1 g/hgl: MTnr. 920275 (IS)
Sendoxan 2 g/hgl: IS/1/04/157/01

9. DAGSETNING FYRSTU ÚTGÁFU MARKAÐSLEYFIS/ENDURNÝJUNAR MARKAÐSLEYFIS

Dagsetning fyrstu útgáfu markaðsleyfis:

Sendoxan 200 mg/hgl: 15. apríl 1971.

Sendoxan 500 mg/hgl: 15. apríl 1971.

Sendoxan 1 g/hgl: 1. júlí 1994.

Sendoxan 2 g/hgl: 18. ágúst 2004.

Nýjasti dagsetning endurnýjunar markaðsleyfis: 22. nóvember 2006.

10. DAGSETNING ENDURSKOÐUNAR TEXTANS

27. ágúst 2025.