

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Hirudoid 3 mg/g krem

Hirudoid 3 mg/g hlaup

múkópólýsakkaríð pólýsúlfat

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að nota lyfið. Í honum eru mikilvægar upplýsingar.

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og lækinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum eða ráðgjöf.
- Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.
- Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Hirudoid og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Hirudoid
3. Hvernig nota á Hirudoid
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Hirudoid
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Hirudoid og við hverju það er notað

- Hirudoid krem 3 mg/g er hvítt, einsleitt, sleipt krem með týmóllykt (brennd eða reykt lykt).
- Hirudoid hlaup 3 mg/g er hvítt, einsleitt hlaup.
- Hirudoid verkar með því að hindra storknun blóðs og er notað til meðferðar við æðabólgu, blóðtöppum og blóðsöfnun í yfirborði húðar.

2. Áður en byrjað er að nota Hirudoid

Verið getur að lækinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Hirudoid

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir kondróítín pólýsúlfati (heparinoid) eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).

Varnaðarorð og varúðarreglur

Eingöngu má nota Hirudoid á heila húð.

Hirudoid krem inniheldur 1,6 mg af metýlparahýdroxýbensóati (E218) og 0,4 mg af própýlparahýdroxýbensóati (E216) = samtals 2 mg af parahýdroxýbensóötum í 1 g af kremi. Parahýdroxýbensóöt geta valdið ofnæmisviðbrögðum (hugsanlega síðkomnum).

Hirudoid krem inniheldur 31,05 mg af cetósterýlalkóhóli í 1 g af kremi

Cetósterýlalkóhól getur valdið staðbundnum húðviðbrögðum (t.d. snertihúðbólgu).

Hirudoid hlaup inniheldur 5 mg af própýlenglýkóli í 1 g af hlaupi

Própýlenglýkól getur valdið húðertingu.

Meðganga

Óhætt er að nota Hirudoid á meðgöngu.

Brjóstagið

Óhætt er að nota Hirudoid samtímis brjóstagið.

3. Hvernig nota á Hirudoid

Ráðlagður skammtur

Fullorðnir:

- *Kremi*; kremið er borið á húðsvæðið sem um ræðir og umhverfis það, 2-3 sinnum á dag. Kreminu er nuddað varlega inn í húðina. Magn af kremi fer eftir stærð svæðisins.
- *Hlaup*; hlaupið er borið varlega á húðsvæðið sem um ræðir og umhverfis það, 2-3 sinnum á dag. Magn af hlaupi fer eftir stærð svæðisins.

Börn:

Ekki á að nota Hirudoid handa börnum yngri en 15 ára nema að læknisráði.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um af Hirudoid?

Ekki liggja fyrir neinar upplýsingar um eitúráhrif.

Hafið samband við lækinn, bráðamóttöku eða lyfjafræðing ef notaður hefur verið stærri skammtur af Hirudoid en fram kemur í þessum fylgiseðli eða meira en lækinn ávísar (og þú finnur fyrir vanlíðan).

Ef gleymist að nota Hirudoid?

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum. Aukaverkanir eru taldar upp hér fyrir neðan eftir alvarleika og tíðni. Tilkynnt hefur verið um eftirtaldar aukaverkanir.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar:

- **Mjög sjaldgæfar aukaverkanir** (geta komið fram hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sem fá meðferð): Húðerting getur komið fram á húðsvæðum sem hafa komist í snertingu við Hirudoid.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Hirudoid

Geymið lyfið þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ekki skal nota lyfið eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á pakkanum. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hirudoid inniheldur

- Hirudoid, 3 mg/g krem og hlaup.
- Virka innihaldsefnið Hirudoid er múkópólýsakkaríð pólýsúlfat (heparinoid).
- Önnur innihaldsefni í **Hirudoid kremi** eru: Glýseról, vatnsfrítt eucerin, sterínsýra, kalíum hýdroxíð, fleytandi cetosterýlalkóhól, ísóprópýl alkóhól, mýristýl alkóhól, týmól, metýlparahýdroxýbensóat, própýlparahýdroxýbensóat og hreinsað vatn.
- Önnur innihaldsefni í **Hirudoid hlaupi** eru: Ísóprópýl alkóhól, própýlenglýkól, natríum hýdroxíð, karbómer og hreinsað vatn.

Markaðsleyfishafi

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
D-61118 Bad Vilbel
Þýskaland

Framleiðandi

Wagener & Co. GmbH
Lohesch 60
49525 Lengerich
Þýskaland

og

STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18
61118 Bad Vilbel
Þýskaland

Hafið samband við fulltrúa markaðsleyfishafa á hverjum stað ef óskað er upplýsinga um lyfið:

Umboð á Íslandi

Icepharma hf
Lynghálsi 13
110 Reykjavík
www.icepharma.is

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í maí 2026.