

Fylgiseðill: Upplýsingar fyrir notanda lyfsins

Madopar Quick „62,5“ og „125“ lausnartöflur 50 mg/12,5 mg og 100 mg/25 mg

levódópa/benserazíð

Lesið allan fylgiseðilinn vandlega áður en byrjað er að taka lyfið.

- Geymið fylgiseðilinn. Nauðsynlegt getur verið að lesa hann síðar.
- Leitið til læknisins, lyfjafræðings eða hjúkrunarfræðingsins ef þörf er á frekari upplýsingum.
- Þessu lyfi hefur verið ávísað til persónulegra nota. Ekki má gefa það öðrum. Það getur valdið þeim skaða, jafnvel þótt um sömu sjúkdómseinkenni sé að ræða.
- Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Sjá kafla 4.

Í fylgiseðlinum eru eftirfarandi kaflar:

1. Upplýsingar um Madopar Quick og við hverju það er notað
2. Áður en byrjað er að nota Madopar Quick
3. Hvernig nota á Madopar Quick
4. Hugsanlegar aukaverkanir
5. Hvernig geyma á Madopar Quick
6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

1. Upplýsingar um Madopar Quick og við hverju það er notað

- Madopar Quick er lyf við Parkinsonsveiki, sem tilheyrir flokknunum dópamínvirk efni.
- Madopar Quick eykur verkun dópamíns (boðefni í heila). Það dregur þar með úr einkennum Parkinsonsveiki eins og vöðvastífleika og skjálfta. Madopar Quick inniheldur 2 efni. Annars vegar levódópa sem bætir upp skort á dópamíni í heila og hins vegar benserazíð sem gerir það að verkum að nota þarf minna magn af levódópa.
- Madopar Quick á að taka við Parkinsonsveiki.

Verið getur að lækinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjábúð.

2. Áður en byrjað er að nota Madopar Quick

Ekki má nota Madopar Quick

- ef um er að ræða ofnæmi fyrir levódópa eða benserazíði eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins (talin upp í kafla 6).
- á meðgöngu.
- ef þú ert kona á barneignaraldri og notar ekki öruggar getnaðarvarnir.
- ef þú tekur ísókarboxazíð við þunglyndi (eða önnur lyf af flokki ósérhæfðra MAO-hemla). Madopar Quick má ekki taka fyrr en 2 vikum eftir að meðferð við þunglyndi hefur verið hætt. Leitið ráða hjá lækni.
- ef tekin eru selegilin eða rasagilin við Parkinsonsveiki samtímis móklóbemíði við þunglyndi.
- ef þú ert yngri en 25 ára (þar sem beinagrindin þarf að vera fullþroskuð).
- ef þú ert með sjúkdóm í heiladingli, skjaldkirtli eða nýrnahettum.
- ef þú ert með lélega nýrnastarfsemi.
- ef þú ert með lélega lifrarástarfsemi.
- ef þú ert með hjartasjúkdóm (alvarlegar hjartsláttartruflanir eða hjartabilun).
- ef þú þjáist af geðsjúkdómi með geðrofseinkennum.
- ef þú ert með hækkaðan þrýsting í augum (gláka).

- ef þú færð bráðan geðsjúkdóm eða breytta hegðun og skilning á umhverfinu, sem og skort á áttun.
- ef þú þjáist af þunglyndi.
- ef þú ert með eða hefur áður fengið sár eða æxli í húð ef ekki er vitað með vissu hvort það er eða var góðkynja.

Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun Madopar Quick

Áður en meðferð með Madopar Quick hefst skaltu segja læknum frá því ef þú

- ert með hjartasjúkdóm, svo sem þrengingar í kransæðum, óreglulegan hjartslátt eða hjartabilun.
- ert á meðferð með öðrum lyfjum við Parkinsonsveiki (levódópa). Yfirleitt stöðvar lækningarnar meðferð með levódópa a.m.k. 12 klukkustundum áður en Madopar Quick er tekið.
- ef þú hefur fengið magasár. Koma má í veg fyrir óþægindi frá maga með því að taka Madopar Quick með mat eða vökva. Leitið ráða hjá læknum.
- hefur fengið krampaköst.
- ert með sykursýki. Blóðsykur skal mæla reglulega. Kannski þarf lækningarnar að breyta meðferðinni.
- ert með gláku. Við sum form af gláku (langvinna gleiðhornsgláku) má nota Madopar Quick, ef augnsjúkdómurinn er undir góðri stjórn. Leita skal ráða hjá læknum undir öllum kringumstæðum.
- ert í meðferð með lyfjum sem hafa áhrif á miðtaugakerfi, svo sem morfíni og svipuðum efnum.
- ert aldrafur/öldruð, notar lyf við of háum blóðþrýstingi eða ert með eða hefur verið með tiltekna gerð lágs blóðþrýstings sem nefnist réttstöðuprýstingsfall.

Hafa skal samband við lækni ef þú

- hefur áður verið á meðferð með levódópa (annað lyf við Parkinsonsveiki) og ósjálfráðar hreyfingar hafa komið fram við meðferð með Madopar Quick. Nauðsynlegt getur verið að lækningarnar minnki skammta.
- færð ósjálfráðar hreyfingar og finnur fyrir breytingu á andlegri líðan. Nauðsynlegt getur verið að lækningarnar minnki skammta.
- ert með eða færð þunglyndi.
- þarft að gangast undir aðgerð með svæfingu. Segja skal læknum frá Madopar Quick meðferðinni.
- finnur fyrir ofnæmisviðbrögðum svo sem skyndilegum útbrotum á húð eða öndunarerfiðleikum.

Hafa skal strax samband við lækni, ef þú

- færð hita, umtalsverðan vöðvastirðleika og skapbreytingar. Einkenni geta verið lífshættuleg og þarfnast tafarlausrar lækningameðferðar.

Fylgjast skal vel með eftirfarandi atriðum:

- Meðferð með Madopar Quick getur valdið skyndilegum svefni við dagleg störf, stundum án þess að syfja komi fram. Því skal gæta sérstakrar varúðar við akstur bíla eða bifhjóla, hjóleiðar eða stjórnun véla á meðan Madopar Quick er tekið. Leitið ráða hjá læknum.
- Þegar Madopar Quick er tekið á að rannsaka blóð og þvag. Hjartastarfsemi er yfirleitt einnig rannsökuð.
- Við blóð- eða þvagranssókn á alltaf að láta vita um Madopar Quick meðferðina, þar sem það getur haft áhrif á niðurstöður mælinga á blóðsykri, ketónum í þvagi og annarra mælinga. Leitið ráða hjá læknum.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Látið lækningarnar vita ef þú eða fjölskylda/meðferðaraðili tekur eftir að þú hafir hvatir eða langanir til hegðunar sem er óvenjuleg fyrir þig eða ef þú stenst ekki hvatir eða freistingar til að gera eitthvað sem getur skaðað þig eða aðra. Þessi hegðun er kölluð hvatastjórnunarröskun (impulse control disorder) og til hennar telst til dæmis spilafíkn, ofát eða ofeyðsla, óeðlilega mikil kynhvöt eða aukning á kynferðislegum hugsunum eða tilfinningum. Lækningarnar gæti þurft að breyta meðferðinni.

Madopar Quick getur aukið líkur á æxli í húð. Vertu því á varðbergi gagnvart breytingum á húð og láttu lækinn vita ef vart verður við þær.

Madopar Quick getur valdið heilkenni sem leiðir til vandamála við að stjórna magni dópamíns (dópamínvanstjórnunarheilkenni). Þetta getur leitt til þess að þú notir meira af lyfinu en lækinn ráðlagði og þú þarft á að halda til að meðhöndla einkenni þín. Slík notkun getur leitt til vitrænna vandamála (vandamála við að skynja atburði og bregðast við þeim) og atferlisvandamála.

Notkun annarra lyfja samhliða Madopar Quick

Látið lækinn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Þú mátt ekki taka Madopar Quick ef þú ert á meðferð með ísókarboxazíði (lyf við þunglyndi). Leitið ráða hjá læknum.

Þú mátt ekki taka Madopar Quick ef þú tekur selegilin eða rasagilin við Parkinsonsveiki samtímis móklóbemíði við þunglyndi. Leitið ráða hjá læknum.

Leitaðu ráða hjá læknum, ef þú tekur

- önnur lyf við Parkinsonsveiki (t.d. selegilín, rasagilín, COMT-hemla eða andkólínvirk lyf). Nauðsynlegt getur verið að breyta Madopar Quick skammti.
- lyf við astma eða reykingalungum (langvinnum lungnateppusjúkdómi (KOL)) (andkólínvirk lyf).
- lyf við þunglyndi (t.d. móklóbemíð, þríhringlaga þunglyndislyf). Nauðsynlegt getur verið að breyta skammti.
- járn (járnsúlfat, járnglúkonat). Járn og Madopar Quick skal taka á mismunandi tímum. Leitið ráða hjá læknum.
- lyf við ógleði og uppköstum (metóklópramíð og domperidon).
- lyf við geðklofa og öðrum geðsjúkdómum (risperidón, fenótíazín, bútýrofenón).
- lyf við flogaveiki (fenýtóín).
- lyf við krömpum í meltingarvegi (papaverín).
- lyf við miklum verkjum (ópíóíðar).
- lyf við berklum (ísóníazíð).
- lyf við háþrýstingi, svo sem reserpín. Nauðsynlegt getur verið að breyta skammti.
- lyf sem verka á taugakerfið svo sem morfín og lík lyf.

Láttu lækinn vita að þú sért að taka Madopar Quick ef þú þarft að fara í skurðaðgerð með fullri svæfingu.

Ef blóðþrýstingur lækkar skyndilega og gefin er meðferð með stungulyfi (t.d. adrenalíni, noradrenalíni, ísóprenalíni eða dópamíni), skal segja læknum frá Madopar Quick meðferðinni.

Notkun Madopar Quick með mat eða drykk

Taka á Madopar Quick minnst 30 mínútum fyrir máltíð eða 1 klukkustund eftir máltíð. Madopar Quick töfluna á að leysa upp í glasi af vatni (25 ml) og verður hún að mjólkurkenndri lausn innan fárra mínútna. Madopar Quick á að taka innan hálf tíma frá því að taflan leysist upp. Hræra á í mjólkurkenndum vökvanum áður en lyfið er tekið inn þar sem botnfall er fljótt að myndast.

Leitið ráða hjá læknum ef hápróteinfæði er notað.

Meðganga og brjóstgjöf

Leitið ráða hjá læknum eða lyfjafræðingi áður en lyf eru notuð.

Meðganga

Madopar Quick má ekki taka á meðgöngu.

Konur á barneignaraldri eiga að nota örugga getnaðarvörn á meðan Madopar Quick er tekið. Ráðlagt er að gera þungunarpróf áður en meðferð er hafin, til að útiloka þungun. Leitið ráða hjá læknum.

Ef þú ert á Madopar Quick meðferð og grunur leikur á þungun skal tafarlaust leita til læknis.

Brjóstagjöf

Konur með barn á brjósti mega eingöngu taka Madopar Quick í samráði við lækinn.

Akstur og notkun véla

Madopar Quick getur verkað svo sljóvgandi á suma að það getur haft áhrif á hæfni til aksturs og stjórnunar véla.

Meðferð með Madopar Quick getur valdið skyndilegum svefni, jafnvel án þess að syfja komi fram. Því skal gæta sérstakrar varúðar við akstur bíla eða bifhjóla, hjólreiðar eða stjórnun véla á meðan Madopar Quick er tekið.

Ef syfja kemur fram eða skyndilegur, fyrirvaralaus svefn má ekki aka bíl, bifhjól eða hjóla og heldur ekki stjórna tækjum eða vélum, þar sem skert athygli getur stofnað lífi og heilsu þinni og annarra í hættu. Leitið ráða hjá læknum.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

3. Hvernig nota á Madopar Quick

Notið lyfið alltaf eins og lækinn hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá læknum eða lyfjafræðingi.

Taka á Madopar Quick minnst 30 mínútum fyrir máltíð eða 1 klukkustund eftir máltíð. Madopar Quick töfluna á að leysa upp í glasi af vatni (25 ml) og verður hún að mjólkurkenndri lausn innan fárra mínútna. Madopar Quick á að taka innan hálf tíma frá því að taflan leysist upp. Hræra á í mjólkurkenndum vökvanum áður en lyfið er tekið inn þar sem botnfall er fljótt að myndast.

Venjulegur skammtur

Fullorðnir:

Madopar Quick skammtur er aðlagður að þörfum hvers einstaklings.

Almennt hefst meðferð með því að gefa 1 Madopar Quick “62,5” töflu 3-4 sinnum á dag. Skammt má síðan auka í 1 töflu “125” 4-6 sinnum á dag. Taktu lyfið eins og lækinn hefur sagt til um.

Aðeins má breyta skammti eða stöðva meðferð í samráði við lækinn.

Madopar Quick er sérstaklega hentugt fyrir sjúklinga sem eiga erfitt með að kyngja eða þegar þörf er á hraðri verkun.

Ef fram koma óþægindi frá maga getur dugað að taka Madopar Quick með svolitlum mat eða vökva. Magaóþægindi koma yfirleitt fram í upphafi Madopar Quick meðferðar. Leitið ráða hjá læknum.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafið umbúðir lyfsins við höndina.

Einkenni um ofskömmtnu eru áhrif á hjarta eins og óreglulegur púls. Auk þess rugl, svefnleysi, ógleði, uppköst og óeðlilegar, ósjálfráðar hreyfingar.

Ef gleymist að taka Madopar Quick

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Þú skalt bara taka næsta skammt eins og venjulega.

Ef hætt er að nota Madopar Quick

Ekki má gera hlé á meðferð eða stöðva hana nema í samráði við lækinn. Ef taka á minni skammt þarf að minnka skammtinn hægt. Ef meðferð er skyndilega hætt eða ef skammturinn er verulega minnkaður geta komið fram margs konar óþægindi eins og hiti, umtalsverður vöðvastífleiki og skapbreytingar. Einkennin geta verið lífshættuleg og þarfnast tafarlausrar meðferðar.

4. Hugsanlegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur þetta lyf valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Alvarlegar aukaverkanir

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fram hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sjúklingum):

- Alvarlegt blóðleysi með gulu. Hafið samband við lækni eða slysadeild.
- Blæðing frá húð og slímhúðum og marblettir vegna breytinga í blóði (of fáar blóðflögur). Hafið samband við lækni eða slysadeild.
- Hár hiti, vöðvastirðleiki, mikil svitamyndun, takmörkuð meðvitund (illkynja sefunarheilkenni). Getur komið fram ef meðferð er skyndilega hætt og getur verið lífshættulegt. Hringið í 112.

Aukaverkanir, þar sem tíðni er ekki þekkt

- Blóðug uppköst og/eða svartar hægðir vegna blæðinga í maga og þörmum. Hafið strax samband við lækni eða slysadeild. Hringið í 112 ef við á.

Aukaverkanir sem ekki eru alvarlegar

Algengar eða mjög algengar aukaverkanir (koma fram hjá fleirum en 1 af hverjum 100 sjúklingum):

- Rugl.

Algengar aukaverkanir (koma fram hjá 1 til 10 af hverjum 100 sjúklingum):

- Þunglyndi. Getur orðið alvarleg aukaverkun hjá sumum. Leitið ráða hjá læknum.
- Ofskynjanir. Geta verið alvarlegar. Hafið samband við lækni eða slysadeild ef við á.
- Óreglulegur hjartsláttur. Getur verið eða orðið alvarlegt. Leitið ráða hjá læknum.
- Sundl, hugsanlega yfirlið þegar sest er upp úr liggjandi stöðu eða staðið er upp úr sitjandi stöðu vegna lágs blóðþrýstings.
- Höfuðverkur.
- Sýkingar með hita.
- Berkjubólga.
- Kvef.
- Ósjálfráðar hreyfingar, t.d. í höndum, fingrum, fótum, andliti og tungu.
- Versnun á óróa í fótum (fótapirringur).
- Svefnleysi.
- Eirðarleysi, óróleiki, kvíði.
- Sveiflur í verkun Madopar Quick við langvarandi notkun.
- Niðurgangur, ógleði, uppköst, lysterleysi og munnþurrkur. Þessar aukaverkanir lagast stundum af sjálfu sér, ræðið það við lækinn.

Sjaldgæfar aukaverkanir (koma fram hjá 1 til 10 af hverjum 1.000 sjúklingum):

- Óreglulegur puls vegna aukaslaga. Getur verið eða orðið alvarlegt. Talið við lækinn.

Mjög sjaldgæfar aukaverkanir (koma fram hjá 1 til 10 af hverjum 10.000 sjúklingum):

- Almennur sljóleiki, tilhneiging til bólgu (sýkingar), sérstaklega hálsbólgu og hita vegna breytinga í blóði (of fá hvít blóðkorn). Getur orðið alvarlegt. Ef þú færð hita skal strax hafa samband við lækni.
- Ofnæmisviðbrögð í húð eins og kláði og útbrot.

Aukaverkanir sem koma örsjaldan fyrir (koma fram hjá færri en 1 af hverjum 10.000 sjúklingum):

- Skyndilegur svefn að degi til. Getur verið eða orðið alvarlegt. Leitið ráða hjá læknum.
- Hækkaður blóðþrýstingur. Leitið ráða hjá læknum. Meðhöndla á of háan blóðþrýsting. Mikil hækkun á blóðþrýstingi er alvarleg.
- Ranghugmyndir. Getur verið eða orðið alvarlegt. Leitið ráða hjá læknum.
- Litabreyting á þvagi, yfirleitt með rauðum bjarma.
- Óeðlileg þreyta og syfja að meðtalinni umtalsverðri þreytu að degi til.
- Bragðtruflanir.
- Tímabundinn skortur á áttun.

Aukaverkanir, þar sem tíðni er ekki þekkt

- Lystarleysi (lystarstol).
- Mislitun munnvatns.
- Mislitun tungu og tanna.
- Mislitun slímhúðar í munni.
- Dópamínvanstjórnunarheilkenni.

Madopar Quick getur auk þess valdið aukaverkunum sem þú finnur venjulega ekki fyrir. Þetta á við um breytingar á vissum rannsóknarstofuprófunum, t.d. áhrif á lifur, sem kemst í eðlilegt horf þegar meðferð er hætt.

Þú gætir einnig fundið fyrir eftirfarandi aukaverkunum:

Getuleysi til að standast hvatir eða freistingar til að gera eitthvað sem getur verið skaðlegt fyrir þig eða aðra, þetta getur til dæmis verið:

- Sterkar hvatir til að stunda fjárhættuspil þrátt fyrir alvarlegar afleiðingar, fyrir þig eða fjölskylduna.
- Breyttur eða aukinn kynferðislegur áhugi og hegðun sem er verulegt áhyggjuefni fyrir þig eða aðra, til dæmis, aukin kynhvöt.
- Óstjórnandi kaupsýki eða ofeyðsla.
- Ofát (mikils magns matar neytt yfir stutt tímabil) eða árátukennt át (meira magns af mat er neytt en þykir eðlilegt og meira en þörf er á til að seðja hungur).

Látið lækinn vita ef vart verður við hegðun sem talin er upp hér að framan, lækinn mun ræða um leiðir til að ráða við eða draga úr einkennum.

Tilkynning aukaverkana

Látið lækinn, lyfjafræðing eða hjúkrunarfræðinginn vita um allar aukaverkanir. Þetta gildir einnig um aukaverkanir sem ekki er minnst á í þessum fylgiseðli. Einnig er hægt að tilkynna aukaverkanir beint til Lyfjastofnunar, www.lyfjastofnun.is. Með því að tilkynna aukaverkanir er hægt að hjálpa til við að auka upplýsingar um öryggi lyfsins.

5. Hvernig geyma á Madopar Quick

- Geymið Madopar Quick þar sem börn hvorki ná til né sjá.
- Geymið Madopar Quick í upprunalegum ytri umbúðum.
- Madopar Quick á að taka innan hálf tíma frá því að taflan leysist upp.
- Madopar Quick má geyma við venjulegan stofuhita.
- Geymið töfluflátið vel lokað til varnar gegn raka.
- Ekki skal nota Madopar Quick eftir fyrningardagsetningu sem tilgreind er á umbúðunum. Fyrningardagsetning er síðasti dagur mánaðarins sem þar kemur fram.

Ekki má skola lyfjum niður í frárennslislagnir eða fleygja þeim með heimilissorpi. Leitið ráða í apóteki um hvernig heppilegast er að farga lyfjum sem hætt er að nota. Markmiðið er að vernda umhverfið.

6. Pakkningar og aðrar upplýsingar

Hvað innihalda Madopar Quick lausnartöflur „62,5“ og „125“

- Virku innihaldsefnin eru levódópa og benserazíð.
- Önnur innihaldsefni eru: Vatnsfrí sítrónusýra, forhleypt maíssterkja, örkristallaður sellulósi og magnesíumsterat.

Útlit Madopar Quick og pakkningastærðir

Útlit

Madopar Quick „62,5“ er hvít tafla með deiliskoru og merkt ROCHE 62,5

Madopar Quick „125“ er hvít tafla með deiliskoru og merkt ROCHE 125.

Pakkningastærðir

Ílát með 100 lausnartöflum.

Markaðsleyfishafi og framleiðandi

Markaðsleyfishafi

Roche Pharmaceuticals A/S

Flaskehalsen 17, 4. hæð

1799 Kaupmannahöfn

Danmörk

Framleiðandi

Roche Pharma AG

Emil-Barell Str.1

79639 Grenzach-Wyhlen, Þýskaland

Umboð á Íslandi

Icepharma hf, Lynghálsi 13, 110 Reykjavík.

Þessi fylgiseðill var síðast uppfærður í nóvember 2022.